ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Jeunesse

Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique

Concours National Commun d'Admission aux Grandes Écoles d'Ingénieurs

Session 2003

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES I

Durée 4 heures

Concours **MP**

Cette épreuve comporte 4 pages au format A4, en plus de cette page de garde
L'usage de la calculatrice est *interdit*

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1647 - Wadifa Info - page 1/6

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats du concours MP, comporte 4 pages.
L'usage de la calculatrice est interdit .

Les candidats sont informés que la précision des raisonnements ainsi que le soin apporté à la rédaction seront des éléments pris en compte dans la notation. Les candidats pourront admettre et utiliser le résultat d'une question non résolue s'ils l'indiquent clairement sur la copie. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

Définitions et notations

On travaille dans $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, qui est l'espace vectoriel de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$; on notera aussi $\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{C}^p(\mathbb{R})$, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$) le sous-espace vectoriel des fonctions continues (resp. de classes $\mathcal{C}^p$, $\mathcal{C}^\infty$) à valeurs complexes. Pour toute fonction $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ et tout réel x, on pose

$$\hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixt} f(t)\, dt,$$

lorsque cette quantité a un sens.

Quand elle est définie, La fonction $\hat{f}$ s'appelle la transformée de FOURIER de f.

I. ÉTUDE D'UN EXEMPLE

1. Soient x et α deux réels strictement positifs.

   (a) Justifier l'intégrabilité de la fonction $t \mapsto \frac{1-e^{-t}}{t}$ sur l'intervalle $]0, \alpha]$.

   (b) Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ est intégrable sur l'intervalle $[x, +\infty[$.

2. Dans la suite, φ désigne la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $\varphi(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\, dt$.

   (a) Montrer que, pour tout réel strictement positif x, $0 < \varphi(x) < \frac{e^{-x}}{x}$.

   (b) Justifier que φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner l'expression de φ'.

   (c) Montrer que, lorsque x tend vers 0^+, $\varphi(x) + \ln x$ tend vers

   $$C = \varphi(1) - \int_0^1 \frac{1 - e^{-t}}{t}\, dt.$$

   (on pourra exprimer $\ln x$ sous forme d'une intégrale.)

   (d) Montrer que, pour tout $x > 0$,

   $$\varphi(x) + \ln x = C + \int_0^x \frac{1 - e^{-t}}{t}\, dt,$$

   et en déduire que

   $$\varphi(x) + \ln x = C + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{x^k}{k!}.$$

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1647 - Wadifa Info - page 2/6

3. Soit ψ la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$\psi(x) = \frac{1}{2}\,\varphi(|x|).$$

(a) Montrer que ψ est intégrable sur les deux intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

(b) Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\widehat{\psi}(x)$ a un sens et que

$$\widehat{\psi}(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t)\cos(xt)\,dt.$$

(c) Montrer que $\widehat{\psi}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer ses dérivées successives sous forme d'intégrales.

(d) Montrer que, pour tout réel non nul x, on a

$$\widehat{\psi}(x) = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\sin(xt)\,dt,$$

et calculer $\widehat{\psi}(0)$.

4. (a) Montrer que la fonction $\Phi : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\sin(xt)\,dt$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer $\Phi'(x)$, pour tout $x > 0$, puis l'exprimer sans utiliser le signe intégrale.

(b) En déduire soigneusement que pour tout réel non nul x,

$$\widehat{\psi}(x) = \frac{\arctan x}{x}.$$

II. Quelques propriétés de la Transformée de Fourier d'une fonction

1. **Transformée de Fourier d'une fonction intégrable**

(a) Soit f une fonction continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$; montrer que pour tout réel x, $\hat{f}(x)$ est bien définie et que la fonction $\hat{f}$ est bornée.

(b) Si en plus f est continue, montrer que $\hat{f}$ est aussi continue.

2. **Transformations**

(a) Montrer que l'application $F : \varphi \mapsto \hat{\varphi}$, définie sur l'espace vectoriel des fonctions complexes continues par morceaux et intégrables sur $\mathbb{R}$, à valeur dans $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, est linéaire.

Dans la suite de cette question, f est une fonction continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$.

(b) Vérifier que pour tout réel a, les fonctions $f_a : t \mapsto f(t-a)$ et ${}_af : t \mapsto f(at)$ possèdent des transformées de Fourier et montrer que

$$\forall\, x \in \mathbb{R},\quad \widehat{f_a}(x) = e^{-iax}\hat{f}(x) \quad \text{et} \quad \widehat{{}_af}(x) = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{x}{a}\right)\ (a \neq 0).$$

(c) Exprimer de même la transformée de Fourier de l'application $t \mapsto f(t)e^{iat}$ en fonction de celle de f.

(d) Si f est paire (resp. impaire), donner une expression de sa transformeé de Fourier sous forme d'une intégrale sur $[0, +\infty[$.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1647 - Wadifa Info - page 3/6

(e) Que peut-on alors dire de la tarnsformée de Fourier d'une fonction réelle et paire (resp. impaire).

3. **Dérivation**

On considère un élément f de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$; on suppose que f et f' sont intégrables sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que f tend vers 0 en $\pm\infty$.

(b) Montrer alors que

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, \quad \widehat{f'}(x) = ix\hat{f}(x),$$

puis en déduire que $\hat{f}$ tend vers 0 en $\pm\infty$.

(c) On suppose de plus que l'application $g : \ t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$; montrer que $\hat{f}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, \quad (\hat{f})'(x) = -i\hat{g}(x).$$

III. UNE FORMULE D'INVERSION

A- Un autre exemple

Dans cette section, h désigne la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$; on admet que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\, dt = \sqrt{\pi}$.

1. Vérifier que $\hat{h}$ est bien définie, dérivable sur $\mathbb{R}$ et qu'elle satisfait l'équation différentielle

$$y' + \frac{x}{2}\, y = 0. \qquad (1)$$

2. Résoudre l'équation différentielle (1) et donner l'expression de $\hat{h}$.

3. Donner alors l'expression de la transformée de Fourier de la fonction $t \mapsto e^{-\varepsilon t^2}$, $\varepsilon > 0$.

B- Application à la formule d'inversion

Dans cette section, f désigne une fonction continue, bornée et intégrable sur $\mathbb{R}$ telle que $\hat{f}$ soit aussi intégrable sur $\mathbb{R}$. Soit $(\varepsilon_n)_n$ une suite de réels strictement positifs tendant vers 0.

1. (a) Soit $v \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$. En utilisant le théorème de la convergence dominée, montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v(y) e^{-\varepsilon_n y^2}\, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} v(y)\, dy.$$

(b) Montrer de même que si $w \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ est une fonction bornée alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} w(x + \varepsilon_n y) e^{-y^2}\, dy = w(x)\sqrt{\pi}.$$

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iy(t-x)-\varepsilon_n y^2}\, dy \right) dt = 2\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + 2\sqrt{\varepsilon_n}\, s) e^{-s^2}\, ds.$$

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1647 - Wadifa Info - page 4/6

3. Soit x un nombre réel.

   (a) Justifier que, pour tout couple (p, q) d'entiers naturels non nuls et tout $\varepsilon > 0$,

$$\int_{-p}^{p} e^{ixy-\varepsilon y^2} \left(\int_{-q}^{q} f(t) e^{-iyt}\, dt \right) dy = \int_{-q}^{q} f(t) \left(\int_{-p}^{p} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt.$$

   (b) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{q \to +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy-\varepsilon y^2} \left(\int_{-q}^{q} f(t) e^{-iyt}\, dt \right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy-\varepsilon y^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt}\, dt \right) dy.$$

   (c) Montrer que, pour tout entier naturel non nul q et tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{p \to +\infty} \int_{-q}^{q} f(t) \left(\int_{-p}^{p} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt = \int_{-q}^{q} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt.$$

   (d) En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy-\varepsilon y^2} \hat{f}(y)\, dy.$$

4. Montrer alors que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy} \hat{f}(y)\, dy.$$

FIN DE L'ÉPREUVE

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1647 - Wadifa Info - page 5/6

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - دورة 26 نونبر 2016 -

Modèle de concours d'accès au cycle de formation initiale – École Nationale Supérieure de l'Administration – 26 novembre

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/640

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me