ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Supérieur, de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique

Présidence du Concours National Commun 2008
École Nationale de l'Industrie Minérale
ENIM

Concours National Commun d'Admission aux Grandes Écoles d'Ingénieurs ou Assimilées

Session 2008

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES II

Durée 4 heures

Filière **TSI**

Cette épreuve comporte 4 pages au format A4, en plus de cette page de garde
L'usage de la calculatrice est *interdit*

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1823 - Wadifa Info - page 1/6

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière TSI, comporte 4 pages.
L'usage de la calculatrice est interdit .

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références *des questions abordées.*

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Sur les classes de similitude de matrices carrées d'ordre 2

L'objectif de ce problème est d'étudier quelques propriétés topologiques des classes de similitudes de matrices carrées à coefficients réels ou complexes en liaison avec la diagonalisabilité.

Notations et rappels

Dans ce problème, $\mathbb{K}$ désigne le corps des réels ou celui des complexes ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ l'algèbre des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients dans $\mathbb{K}$; la matrice identité se notera I_2 et toute matrice de la forme λI_2, avec $\lambda \in \mathbb{K}$, est dite *une matrice scalaire*.

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$ désigne le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Pour toute matrice A de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, ${}^tA$ désigne la matrice transposée de A, $\mathrm{tr}\,(A)$ sa trace, $\det A$ son déterminant et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A appartenant à $\mathbb{K}$.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on pose $\|A\|_S = \left(|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2\right)^{1/2}$.

On rappelle que deux matrices A et B de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ sont dites *semblables* dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ s'il existe une matrice $Q \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$ telle que $A = QBQ^{-1}$, cela revient à dire que A et B sont les matrices d'un même endomorphisme de $\mathbb{K}^2$ dans deux bases en général différentes.

L'ensemble $\mathscr{S}_{\mathbb{K}}(A) := \{PAP^{-1};\ P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{K})\}$ est appelé *la classe de similitude* de A dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

I. Résultats préliminaires

1. Quelle est la classe de similitude d'une matrice scalaire de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$?

2. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on pose $\quad E_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $F_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}$.

   (a) Justifier que, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, E_λ et F_λ sont inversibles et exprimer leur inverses.

   (b) Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$; calculer les produits $E_\lambda A E_\lambda^{-1}$ et $F_\lambda A F_\lambda^{-1}$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.

   (c) On suppose que la classe de similitude $\mathscr{S}_{\mathbb{K}}(A)$ de $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est réduite à un singleton. Montrer que A est une matrice scalaire.

3. Soient $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. On suppose que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } A_k = \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}, k \in \mathbb{N}.$$

Définition : On dit que la suite $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice A si les suites $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$, $(b_k)_{k\in\mathbb{N}}$, $(c_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et $(d_k)_{k\in\mathbb{N}}$ convergent respectivement vers a, b, c et d.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1823 - Wadifa Info - page 2/6

(a) Justifier que si la suite $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice A alors A est unique.

(b) Montrer que la suite $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers A si et seulement si la suite $\left(\|A_k - A\|_S\right)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

(c) Montrer que si la suite $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice A alors les suites $(\mathrm{tr}\,(A_k))_{k\in\mathbb{N}}$ et $(\det A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ convergent respectivement vers $\mathrm{tr}\,(A)$ et $\det A$.

4. Montrer que si A et B sont deux matrices semblables de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, elles ont le même déterminant, la même trace et le même polynôme caractéristique.

II. Condition pour qu'une classe de similitude de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ soit fermée

Définition : Une partie $\mathscr{L}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est dite *fermée* si toute suite convergente d'éléments de $\mathscr{L}$ converge vers un élément de $\mathscr{L}$.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

(a) Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda, \mu\}$, justifier que A est semblable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ à la matrice $\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \mu\end{pmatrix}$.

(b) Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda\}$, montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ si et seulement si $A = \lambda I_2$.

(c) Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda\}$ et A n'est pas une matrice scalaire, montrer que A est semblable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ à la matrice $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$.

2. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

(a) Si A est une matrice scalaire, justifier que la classe de similitude $\mathscr{S}_{\mathbb{K}}(A)$ est fermée.

(b) Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda\}$ et A non diagonalisable, on pose $A_k = \begin{pmatrix}2^{-k} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^{k} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $k\in\mathbb{N}$.
Étudier la suite $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et en déduire que la classe de similitude $\mathscr{S}_{\mathbb{K}}(A)$ n'est pas fermée.

(c) Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda, \mu\}$, soit $\left(P_k A P_k^{-1}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathscr{S}_{\mathbb{K}}(A)$ qui converge vers une matrice $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Soit $\alpha\in\{\lambda, \mu\}$.

i. Étudier la suite $\left(P_k(A - \alpha I_2)P_k^{-1}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ et en déduire que $\det(B - \alpha I_2) = 0$.

ii. Justifier alors que B est semblable à A et conclure que $\mathscr{S}_{\mathbb{K}}(A)$ est fermée.

3. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ alors $\mathscr{S}_{\mathbb{C}}(A)$ est fermée si et seulement si A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice telle que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$.

(a) Justifier que $4\det A - (\mathrm{tr}\,(A))^2 > 0$. Dans la suite, on pose

$$A' = \frac{2}{\delta}\left(A - \frac{\mathrm{tr}\,(A)}{2} I_2\right) \text{ et } A'' = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathrm{tr}\,(A) & -\delta\\ \delta & \mathrm{tr}\,(A)\end{pmatrix} \text{ avec } \delta := \sqrt{4\det A - (\mathrm{tr}\,(A))^2}.$$

(b) Montrer que $A'^2 = -I_2$.

(c) On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à A' et on considère un vecteur non nul e de $\mathbb{R}^2$. Montrer que la famille $(e, f(e))$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et écrire la matrice A_1 de f dans cette base.

(d) Exprimer A' en fonction de A_1 et en déduire que les matrices A et A'' sont semblables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1823 - Wadifa Info - page 3/6

(e) Soit $\left(P_k A P_k^{-1}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathscr{S}_{\mathbb{R}}(A)$ qui converge vers une matrice $\tilde{A}$ élément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

i. Montrer que $\mathrm{tr}\,(\tilde{A}) = \mathrm{tr}\,(A)$ et $\det\tilde{A} = \det A$.

ii. Justifier alors que les matrices A et $\tilde{A}$ sont semblables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

5. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ alors $\mathscr{S}_{\mathbb{R}}(A)$ est fermée (dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$) si et seulement si A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ou bien $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$.

III. Un autre aspect de l'étude des classes de similitude de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

A- Résultats utiles

1. $G \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice telle que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(G) \neq \emptyset$. Justifier que les racines du polynôme caractéristique χ_G de G sont toutes réelles.

2. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(a) Vérifier que $\|A\|_S = \sqrt{\mathrm{tr}\,(A^t A)}$.

(b) Soit $U \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice orthogonale ; montrer que $\|A\|_S = \|UA^tU\|_S = \|^tUAU\|_S$.

3. Justifier que l'ensemble $\{\|PAP^{-1}\|_S\ ;\ \ P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})\}$ possède une borne inférieure.

La suite de cette partie sera consacrée au calcul de cette borne inférieure et à la caractérisation des matrices pour lesquelles elle est atteinte ; pour cela, on muni le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ de son produit scalaire canonique noté $(.|.)$, la norme associée sera notée $\|.\|$.

B- Étude du cas d'une matrice ayant des valeurs propres réelles

1. **Un résultat de réduction :** Soit $G \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice telle que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(G) \neq \emptyset$; on note g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à G et on désigne par λ et μ les racines de χ_G (éventuellement confondues) ; ce sont les valeurs propres de g. On choisi un vecteur propre u_1' de g, associé à la valeur propre λ, qu'on complète en une base (u_1', u_2') de $\mathbb{R}^2$ et on note (u_1, u_2) la base orthonormée de l'espace euclidien $(\mathbb{R}^2, (.|.))$ obtenue en appliquant le procédé de Schmidt à la famille (u_1', u_2').

(a) Rappeler les expressions des vecteurs u_1 et u_2 en fonction des vecteurs u_1' et u_2'.

(b) On note U la matrice de passage de la base canonique (e_1, e_2) de $\mathbb{R}^2$ à la base (u_1, u_2) ; justifier que $U^tU = I_2$.

(c) On note T la matrice de g dans la base (u_1, u_2). Justifier que T est de la forme $\begin{pmatrix}\lambda & \alpha\\ 0 & \mu\end{pmatrix}$, où α est un réel, et que $G = UT^tU$. Que vaut $\|G\|_S$?

2. **Calcul de la borne inférieure en question :** On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \neq \emptyset$, et on désigne par λ et μ les valeurs propres de A (éventuellement confondues).

(a) Montrer que, pour toute matrice $B \in \mathscr{S}_{\mathbb{R}}(A)$, $\|B\|_S \geqslant \sqrt{\lambda^2+\mu^2}$.

(b) Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout réel non nul t, la matrice $\begin{pmatrix}\lambda & t\alpha\\ 0 & \mu\end{pmatrix} \in \mathscr{S}_{\mathbb{R}}(A)$.

(c) Déduire de ce qui précède que $\inf\limits_{B\in\mathscr{S}_{\mathbb{R}}(A)} \|B\|_S = \sqrt{\lambda^2+\mu^2}$.

(d) Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si la borne inférieure de l'ensemble $\{\|PAP^{-1}\|_S\ ;\ \ P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})\}$ est atteinte. (*pour montrer que la condition est suffisante, on pourra utiliser le résultat de la question* 1.)

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1823 - Wadifa Info - page 4/6

C. Cas où la matrice n'a aucune valeur propre réelle

On considère une matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ n'ayant aucune valeur propre réelle, ce qui signifie que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(M) = \emptyset$. On a déjà vu que $4\det M - (\mathrm{tr}\,(M))^2 > 0$, on pose alors $\delta := \sqrt{4\det M - (\mathrm{tr}\,(M))^2}$ et

$$M' = \frac{2}{\delta}\Big(M - \frac{\mathrm{tr}\,(M)}{2} I_2\Big), \quad M'' = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathrm{tr}\,(M) & -\delta \\ \delta & \mathrm{tr}\,(M) \end{pmatrix}.$$

On rappelle que $M'^2 = -I_2$ et on note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à M'.

1. Si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, justifier que la matrice M' est de la forme $M' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{pmatrix}$, où α, β et γ sont des réels à préciser en fonction de a, b, c et d, puis vérifier que $\alpha^2 + \beta\gamma = -1$.

2. Pour tout vecteur $v = (x, y)$ de l'espace euclidien $(\mathbb{R}^2, (.|.))$, exprimer le produit scalaire $(v|f(v))$ et montrer qu'il existe un vecteur non nul $e \in \mathbb{R}^2$ tel que la famille $\big(e, f(e)\big)$ soit orthogonale. Justifier que $f(e) \neq 0$.

3. Un tel vecteur e étant choisi, on pose $u_1 = \frac{1}{\|e\|}.e$ et $u_2 = \frac{1}{\|f(e)\|}.f(e)$; Vérifier que (u_1, u_2) est une base orthonormée de l'espace euclidien $(\mathbb{R}^2, (.|.))$ et écrire la matrice M_1 de f dans cette base.

4. On note U la matrice de passage de la base canonique (e_1, e_2) de $\mathbb{R}^2$ à la base (u_1, u_2) ; justifier que U est une matrice orthogonale et exprimer M' en fonction de M_1 puis en déduire que $M = UM_2\,{}^tU$ où $M_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathrm{tr}\,(M) & -\delta\ell \\ \frac{\delta}{\ell} & \mathrm{tr}\,(M) \end{pmatrix}$, ℓ étant un réel > 0 à préciser.

5. On sait, d'après les parties précédentes, que l'ensemble $\{\|PMP^{-1}\|_S\ ;\ \ P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})\}$ possède une borne inférieure et que les matrices M et M'' sont semblables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

   (a) Justifier que $\inf_{B \in \mathscr{S}_{\mathbb{R}}(M)} \|B\|_S \leqslant \|M''\|_S = \sqrt{2\det M}$.

   (b) Montrer que $\|M_2\|_S \geqslant \|M''\|_S$ et que, plus généralement, $\|B\|_S \geqslant \sqrt{2\det M}$ pour toute matrice $B \in \mathscr{S}_{\mathbb{R}}(M)$.

6. Conclure que la borne inférieure de l'ensemble $\{\|PMP^{-1}\|_S\ ;\ \ P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})\}$ est atteinte, donner sa valeur et caractériser toutes les matrices de $\mathscr{S}_{\mathbb{R}}(M)$ en lesquelles cette borne est atteinte.

D. Conclusion

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$; montrer que la borne inférieure de l'ensemble $\{\|PAP^{-1}\|_S\ ;\ \ P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})\}$ est atteinte si et seulement si la classe de similitude $\mathscr{S}_{\mathbb{R}}(A)$ est fermée.

FIN DE L'ÉPREUVE

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1823 - Wadifa Info - page 5/6

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - دورة 26 نونبر 2016 -

Modèle de concours d'accès au cycle de formation initiale – École Nationale Supérieure de l'Administration – 26 novembre

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/640

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me