



Royaume du Maroc

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres



MARRAKECH
جامعة المراكش
UNIVERSITÉ DE MARRAKECH

المدرسة الوطنية للتجارة
والتسيير - مراكش
ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE
ET DE GESTION - MARRAKECH

PRESIDENCE DU CNAEM 2017

**CONCOURS NATIONAL D'ACCES AUX ECOLES DE
MANAGEMENT
CNAEM 2017**

Filière : ECT
Epreuve de : Mathématiques
Date : Mercredi 17 Mai 2017
Heure : 8H à 12H
Durée : 4H

Notes à lire par le candidat

- Chaque candidat n'a droit qu'à un seul « cahier d'épreuve ».
- Le candidat doit écrire son nom de famille, prénom, centre et numéro d'examen dans la partie réservée à ceci en haut de la 1^{ère} page du cahier d'épreuve, avant de commencer à rédiger, pour valider sa feuille de composition.
- L'usage de toute machine (calculatrice, traductrice, etc.) ou dictionnaire est strictement interdit.
- Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière ECT, comporte 4 pages.

L'usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit

*Les candidats sont informés que la qualité de la réduction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les **références** des questions abordées.*

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Le sujet de cette épreuve est composé de deux exercices et d'un problème indépendants entre eux.

Exercice 1 À propos de la loi exponentielle

Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$; on rappelle que sa densité f est définie par : $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 ; \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$

1. Calculer son espérance $E(X)$ et sa variance $V(X)$.
2. Déterminer sa fonction de répartition notée F .
3. On considère la variable aléatoire $Y = 1 + [X]$, où $[a]$ désigne la partie entière du réel a . Montrer que Y est presque sûrement à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, c-a-d $P(Y \leq 0) = 0$, et que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(Y = k) = (1 - e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}$. Reconnaitre la loi de Y .

Dans la suite de l'exercice, on considère deux variables aléatoires X_1 et X_2 indépendantes et suivant la même loi que X avec $\lambda = 1$.

4. On considère la variable aléatoire $Z = \max(X_1, X_2)$.
 - 4.1. Vérifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\{Z \leq x\} = \{X_1 \leq x\} \cap \{X_2 \leq x\}$.
 - 4.2. Déterminer la fonction de répartition F_Z de la variable aléatoire Z ainsi qu'une densité de Z .
 - 4.3. Calculer l'espérance $E(Z)$ de la variable aléatoire Z .
5. On considère la variable aléatoire $T = \min(X_1, X_2)$.
 - 5.1. Exprimer la variable aléatoire $Z + T$ en fonction de X_1 et X_2 .
 - 5.2. En déduire l'espérance $E(T)$ de la variable aléatoire T .

Exercice 2 Étude d'une suite récurrente

Dans cet exercice, g désigne la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{4} (3x^2 - 2(c+d)x + cd + 2(c+d))$$

On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la donnée de $u_0 = \lambda \in \mathbb{R}$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = g(u_n)$, $n \in \mathbb{N}$.

1. Dans cette question, on suppose que $c = d = 0$.
 - 1.1. Que peut-on dire de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si $\lambda = 0$?
Dans la suite de cette question, on suppose que $\lambda \neq 0$.
 - 1.2. Montrer que $u_n > 0$ pour tout entier naturel $n \geq 1$.
On pose $w_n = \ln u_n$ pour tout entier naturel $n \geq 1$, où $\ln$ désigne le logarithme népérien.

- 1.3. Pour tout entier naturel $n \geq 1$, exprimer w_n en fonction de n et de λ . On pourra commencer par exprimer w_{n+1} en fonction de w_n .
- 1.4. En déduire une expression de u_n en fonction de n et de λ , pour tout entier naturel $n \geq 1$.
- 1.5. Discuter, selon les valeurs du réel λ , la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et préciser sa limite le cas échéant.

2. Dans cette question, on suppose que $c = d = 2$.

- 2.1. Montrer que si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge alors sa limite est égale à 2.
- 2.2. On suppose que $\lambda > 2$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante et qu'elle diverge vers $+\infty$.
- 2.3. Montrer qu'il existe deux réels λ_1 et λ_2 , avec $\lambda_1 < \lambda_2$, tels que $u_1 = 2$ si, et seulement si, $\lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2\}$.
- 2.4. On suppose que $\lambda \in]\lambda_1, \lambda_2[$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite.
- 2.5. On suppose que $\lambda < \lambda_1$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

2.6. Un premier calcul avec Scilab

On prend ici $\lambda = 1$. Recopier et compléter le programme Scilab ci-dessous pour qu'il calcule et affiche le terme u_n pour une valeur de n entrée au clavier.

```
n=input('entrer la valeur de n')
u= ...
for k=1:n
u= ...
end
disp(u)
```

2.7. Un deuxième calcul avec Scilab

On prend $\lambda = 1$ et on saisie le code suivant :

```
n=0
u=1
while u<=1,9999
u= (3*u*u-8*u+12)/4
n=n+1
end
disp(n)
```

Après exécution, quelle est la signification du résultat affiché par ce programme ?

4. Dans cette question, on suppose que $c < d < 2$.

- 4.1. Soit P l'application polynomiale définie par : $P(x) = 3x^2 - 2(2+c+d)x + cd + 2(c+d)$, $x \in \mathbb{R}$. Préciser les valeurs de $P(c)$, $P(d)$ et $P(2)$ puis déterminer leur signe.
- 4.2. On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite ℓ . Montrer que $c < \ell < d$ ou bien $d < \ell < 2$.

Problème

On considère les matrices réelles carrées d'ordre 3 suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -8 & 10 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

1ère Partie

Détermination d'un polynôme annulateur de la matrice A

1.1. Recherche d'un polynôme annulateur de la matrice A 1.1.1. Calculer A^2 puis A^3 .1.1.2. Vérifier que $4A^3 = 3A + I$, où I est la matrice identité d'ordre 3.1.1.3. En déduire un polynôme de degré 3 annulateur de la matrice A .**1.2. Étude des racines d'un polynôme**On considère l'application polynomiale R définie par : $R(x) = 4x^3 - 3x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.1.2.1. Vérifier que 1 est racine de R .1.2.2. Montrer que, pour tout réel x , $R(x) = (x - 1)(2x + 1)^2$.1.2.3. En déduire que $-\frac{1}{2}$ est racine de R .1.3. Quelles sont les valeurs propres possibles de la matrice A ? Justifier votre réponse.**2^{ème} Partie****Réduction de la matrice A et calcul de ses puissances****2.1. Valeurs propres de la matrice A** 2.1.1. Vérifier que les vecteurs $V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ sont des vecteurs propres de la matrice A

et préciser les valeurs propres aux quelles ils sont respectivement associé.

2.1.2. Préciser alors les valeurs propres de la matrice A .**2.2. Inversibilité et inverse de P** 2.2.1. Calculer le produit matriciel PQ .2.2.2. En déduire que la matrice P est inversible et préciser son inverse P^{-1} .**2.3. Relation entre les puissances des matrices A et T** 2.3.1. Calculer les produits matriciels PT et AP .2.3.2. Montrer, pour tout entier naturel $k \geq 1$, l'égalité $A^k = PT^kP^{-1}$.**2.4. Calcul des puissances des matrices A et T** 2.4.1. En faisant un raisonnement par récurrence, montrer que, pour tout entier naturel $k \geq 1$,

$$T^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{-1}{2}\right)^k & k\left(\frac{-1}{2}\right)^k \\ 0 & 0 & \left(\frac{-1}{2}\right)^k \end{pmatrix}.$$

2.4.2. En déduire que, pour tout entier naturel $k \geq 1$,

$$A^k = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 + 6\left(\frac{-1}{2}\right)^k & 3 - 3\left(\frac{-1}{2}\right)^k & 3 - 3\left(\frac{-1}{2}\right)^k \\ 2 + (-2 + 6k)\left(\frac{-1}{2}\right)^k & 2 + (7 - 3k)\left(\frac{-1}{2}\right)^k & 2 - (2 + 3k)\left(\frac{-1}{2}\right)^k \\ 4 + (12 - 18k)\left(\frac{-1}{2}\right)^k & 4 + (-24 + 9k)\left(\frac{-1}{2}\right)^k & 4 + (3 + 9k)\left(\frac{-1}{2}\right)^k \end{pmatrix}.$$

3^{ème} Partie**Application à l'étude d'une marche aléatoire sur le net**

On considère le graphe ci-dessous modélisant un internet simplifié constitué de trois pages (ou sites) placées en ses sommets. Les arrêtes du graphe représentent les liens entres ces trois pages. L'algorithme du « Page Rank » consiste à surfer au hasard sur internet et à compter le nombre de fois qu'on passe sur chacune de ses pages en fonction du temps.




Figure 1 : Schéma du graphe.

Dans ce graphe, la page 1 possède un lien vers la page 3 mais n'a aucun lien vers la page 2 ; la page 2 possède un lien vers la page 1 et un vers la page 3 ; la page 3 possède un lien vers la page 1 et un vers la page 2.

Dans la suite de ce problème, on adopte les notations et les hypothèses suivantes où n désigne un entier naturel et i, j des éléments de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$:

- ✓ $p_n(j)$ désigne la probabilité que l'internaute soit sur la page j à l'instant $t = n$;
- ✓ $p_{i,j}$ désigne la probabilité de se trouver sur la page i à l'instant $t = n + 1$ sachant qu'on était sur la page j à l'instant $t = n$;
- ✓ $A_n(j)$ désigne l'événement "être sur la page j à l'instant $t = n$ " ;
- ✓ on suppose que les événements $A_n(1)$, $A_n(2)$ et $A_n(3)$ ont chacun une probabilité **non nulle** ;
- ✓ on fait l'hypothèse qu'une page a une probabilité nulle de pointer sur elle-même, c'est-à-dire que $p_{i,i} = 0$ pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$;
- ✓ on suppose aussi qu'il y a équiprobabilité entre les liens d'une page ; ainsi, comme la page 2 pointe sur deux pages, la probabilité $p_{1,2}$ d'aller de la page 2 vers la page 1 vaut $\frac{1}{2}$, de même $p_{3,2} = \frac{1}{2}$.
- ✓ on considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & p_{1,3} \\ p_{2,1} & 0 & p_{2,3} \\ p_{3,1} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ dite matrice de transition dont le schéma de la figure 1 ci-dessus s'appelle graphe.

3.1. Compléter la matrice B en précisant les valeurs des réels $p_{1,3}$, $p_{2,1}$, $p_{2,3}$ et $p_{3,1}$.

3.2. Pour $j \in \{1, 2, 3\}$, calculer la somme $p_{1,j} + p_{2,j} + p_{3,j}$ en justifiant votre réponse.

3.3. Montrer que, pour tout entier naturel n , $p_{n+1}(1) = p_{1,1}p_n(1) + p_{1,2}p_n(2) + p_{1,3}p_n(3)$ en précisant le théorème utilisé.

3.4. Donner, sans démonstration, les expressions de $p_{n+1}(2)$ et de $p_{n+1}(3)$ en fonction de $p_n(1)$, $p_n(2)$ et de $p_n(3)$.

3.5. Pour tout entier naturel n , on note X_n la matrice réelle à trois lignes et une colonne définie par :

$$X_n = \begin{pmatrix} p_n(1) \\ p_n(2) \\ p_n(3) \end{pmatrix}.$$

3.5.1. Vérifier que, pour tout entier naturel n , $X_{n+1} = AX_n$.

3.5.2. Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $X_n = A^n X_0$.

3.5.3. En déduire, pour tout entier naturel $n \geq 1$, les valeurs des probabilités $p_n(1)$, $p_n(2)$ et $p_n(3)$ en fonction de n et des probabilités $p_0(1)$, $p_0(2)$ et $p_0(3)$.

3.6. Étude des suites $(p_n(j))_{n \in \mathbb{N}}$ pour $j \in \{1, 2, 3\}$

3.6.1. Préciser les limites des suites $((\frac{-1}{2})^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(n(\frac{-1}{2})^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

3.6.2. Préciser la valeur de la somme $p_0(1) + p_0(2) + p_0(3)$ en justifiant votre réponse.

3.6.3. Déterminer les limites des suites $(p_n(1))_{n \in \mathbb{N}}$, $(p_n(2))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(p_n(3))_{n \in \mathbb{N}}$ qu'on notera respectivement ℓ_1 , ℓ_2 et ℓ_3 .

3.7. Comparaison de la popularité des trois sites

3.7.1. Déduire de ce qui précède l'ordre des trois sites du plus visité au moins visité au fil du temps.

3.7.2. Que représente le vecteur $\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{pmatrix}$ pour la matrice de transition ?

FIN DE L'ÉPREUVE