réponse.

3. Soit un échantillon de 10 observations de

$$X = \{1;\ 3;\ \ldots\}$$

La moyenne de X est égale:

A. 21 B. 4 C. 3 D. 1

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/4174 - Wadifa Info - page 1/4

wadifa-info.com
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/4174 - Wadifa Info - page 2/4

4. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie, pour tout entier n, par: $u_n = \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ vérifie: $\lim_{n\to+\infty} u_n =$

A $+\infty$ B 1 C 2 D $\frac{1}{2}$ E Autre réponse

5. La somme $\sum_{k=3}^{13} \frac{1}{7^k}$ est égale:

A 7 B 3 C $\frac{7^{10}-1}{6\times 7^{10}}$ D $\frac{7^{11}-1}{6\times 7^{11}}$ E Autre réponse.

6. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. La dérivée de f est:

A $\frac{2}{(e^x+e^{-x})^2}$ B $\frac{(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2}$ C $\frac{2e^x}{(e^x+e^{-x})^2}$ D $\frac{4}{(e^x+e^{-x})^2}$ E Autre réponse

7. Si f la fonction définie par $f(x) = (2-x^2)e^{-x}$. Une primitive de f est

A xe^{-x} B x^2e^{-x} C $(2x+x^2)e^{-x}$ D $(2-x^2)e^{-x}$ E Autre réponse

Page 2 of 2

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/4174 - Wadifa Info - page 3/4

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج مباراة ولوج المدارس الوطنية للتجارة والتسيير ENCG 2009 - اختبار الأهلية للتكوين في

Modèle concours d'accès – Réseau des Écoles Nationales de Commerce et de Gestion (ENCG) 2009 – Test d'Admissibilité à

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1185

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me