

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat)
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (n° CNI, centre d'examen)
- Pour répondre aux 40 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la réponse en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

1. L'endométriose peut être un facteur :
 - a. D'infertilité ;
 - b. D'hypofertilité ;
 - c. D'hyperfertilité ;
 - d. Toutes les propositions précédentes sont fausses.
2. Selon la littérature, le recours à la chirurgie comme traitement de l'endométriose :
 - a. 25 % des cas ;
 - b. 35 à 40 % des cas ;
 - c. 50 à 60 % des cas ;
 - d. 90% des cas.
3. Après une intervention chirurgicale, les symptômes d'endométriose récidivent dans :
 - a. 5 % des cas ;
 - b. 10 à 15 % des cas ;
 - c. 20 à 30 % des cas ;
 - d. 25 à 35 % des cas.
4. Le col de l'utérus :
 - a. Est de forme cylindrique ou conique ;
 - b. Mesure 4 à 5 cm de longueur sur 3,5 cm de diamètre ;
 - c. Mesure 3 à 4 cm de longueur sur 2,5 cm de diamètre ;
 - d. Présente en son centre un conduit interne le canal exocervical.
5. Une résolution de l'OMS adoptée en 2002 porte la durée optimale de l'allaitement pour assurer une croissance adéquate de l'enfant, à :
 - a. 4 mois ;
 - b. 6 mois ;
 - c. 8 mois ;
 - d. 10 mois.
6. La lactogénèse débute :
 - a. Vers le 4^{ème} mois de grossesse ;
 - b. A partir du 6^{ème} mois de grossesse ;
 - c. A partir du 7^{ème} mois de grossesse ;
 - d. Juste après l'accouchement.
7. La composition nutritive du lait maternel varie :
 - a. Au fil des mois ;
 - b. Au cours de la tétée ;
 - c. En fonction des besoins de l'enfant ;
 - d. Toutes les propositions précédentes sont justes.
8. Si le début de la tétée se fait sur un sein qui n'a pas eu le temps de se remplir depuis la tétée précédente :
 - a. Il faut absolument conseiller de laisser téter le sein jusqu'au bout ;
 - b. Il est déconseillé de laisser téter le sein jusqu'au bout ;
 - c. Il n'est pas justifié de conseiller de laisser téter le sein jusqu'au bout ;
 - d. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

محمّد الخامس - الرباط - الهاتف : +212 537 76 11 21 - الفاكس : +212 537 76 38 95 - 212 537 76 38 95

335, Avenue Mohammed V Rabat - Tél : +212 537 76 11 21 - Fax : +212 537 76 38 95 - www.san

9. Les éléments protecteurs du lait maternel seraient associés à une diminution du risque :
 - a. D'allergie ;
 - b. D'obésité ;
 - c. De mort subite du nourrisson ;
 - d. De diabète.
10. Le site d'implantation d'un cathéter veineux périphérique le plus recommandé est :
 - a. La main ;
 - b. Le pli du coude ;
 - c. Le pied ;
 - d. Le membre supérieur hors régions articulaires.
11. Le temps maximum d'implantation d'un cathéter veineux périphérique est de :
 - a. Cinq jours ;
 - b. Trois jours ;
 - c. Six jours ;
 - d. Quatre jours mais peut être prolongé avec aval médical.
12. La surveillance d'un cathéter veineux périphérique inclut :
 - a. La date et l'heure de sa pose ;
 - b. Le nom du soignant qui l'a posé ;
 - c. L'aspect du site d'insertion : rougeur ;
 - d. La douleur.
13. L'étiquetage des tubes pour groupe sanguin a lieu :
 - a. Au poste de soins, avant d'aller prélever ;
 - b. En présence du patient, après le prélèvement ;
 - c. Au poste de soins, après le prélèvement ;
 - d. Toutes les propositions précédentes sont valables.
14. Le délai habituel de validité d'une recherche d'anticorps irrégulier (RAI) est de :
 - a. 12 heures ;
 - b. 24 heures ;
 - c. 72 heures ;
 - d. 24 jours.
15. Un sujet de groupe AB peut recevoir des concentrés de globules rouges (CGR) :
 - a. De groupe A ;
 - b. De groupe B ;
 - c. De groupe O ;
 - d. Toutes les propositions précédentes sont justes.
16. Le plasma d'un sujet de groupe O contient :
 - a. Des anticorps anti-A ;
 - b. Des anticorps anti-B ;
 - c. Des anticorps anti-O ;
 - d. Aucun de ces anticorps.
17. Vous avez reçu un concentré de plaquettes et un concentré de globules rouges pour traiter une patiente :
 - a. Vous transfusez le concentré de plaquettes en premier ;
 - b. Vous transfusez le concentré de globules rouges en premier ;
 - c. Peu importe lequel vous transfusez en premier ;
 - d. Vous pouvez transfuser les deux en même temps.
18. Pour les besoins nutritionnels de la femme enceinte, on recommande :
 - a. chez l'hypertendue, un régime sans sel ;
 - b. chez l'épileptique, une supplémentation en acide folique ;
 - c. chez toutes les femmes, une supplémentation en fer ;
 - d. chez toutes les femmes, un régime enrichi en calcium.
19. Parmi les cinq besoins physiologiques de Maslow, un besoin est inexistant :
 - a. Le besoin d'affection ;
 - b. Le besoin de s'accomplir ;
 - c. Le besoin d'estime ;
 - d. Le besoin de sécurité.

20. Quel nom porte les barrières naturelles empêchant la pénétration des microbes ?
- Les globules blancs ;
 - Les globules rouges ;
 - Les muqueuses ;
 - Toutes les propositions précédentes sont fausses.
21. Le délai d'action d'un antiseptique alcoolique est :
- De 25 à 30 secondes ;
 - De 15 à 20 secondes ;
 - De 25 à 30 minutes ;
 - De 15 à 20 minutes.
22. La médecine néonatale concerne la période allant de :
- la naissance jusqu'à 20 jours après la naissance ;
 - la naissance jusqu'à 28 jours après la naissance ;
 - la naissance jusqu'à 20 mois après la naissance ;
 - la naissance jusqu'à 28 mois après la naissance.
23. Un poids de naissance est dit faible si, lors d'une naissance à terme, il est :
- < 2500g ;
 - < 3000g ;
 - < 2000g ;
 - < 1500g.
24. On note comme complication de l'accouchement gémellaire :
- La dystocie mécanique ;
 - La procidence du cordon pour le deuxième jumeau ;
 - Le traumatisme obstétrical pour l'extraction du 1er jumeau ;
 - La souffrance aigüe par anoxie pour le 2ème jumeau.
25. Est contraindiqué pendant la grossesse, le vaccin :
- Contre la rubéole ;
 - Anti poliomyélitique par souche vivante (voie orale) ;
 - Anticholérique ;
 - Anti grippale.
26. L'avortement spontané est défini comme la terminaison d'une grossesse avant :
- 30 semaines d'aménorrhée ;
 - 28 semaines d'aménorrhée ;
 - 26 semaines d'aménorrhée ;
 - 22 semaines d'aménorrhée.
27. Les nouveau-nés Hypotrophiques
- Ce sont les enfants nés à terme et dont le poids est inférieur à 2500 g ;
 - Les enfants dont le poids est inférieur au 10^e percentile ;
 - Ce sont généralement des enfants malnutris, malformés ;
 - Ils peuvent être issus d'une grossesse avec toxémie gravidique.
28. La constatation chez le nouveau-né d'une artère ombilicale unique
- Est sans conséquence clinique ;
 - Doit faire rechercher une anomalie génito-urinaire ;
 - Doit faire rechercher une anomalie chromosomique ;
 - Doit faire rechercher une anomalie rénale.
29. On considère comme complication de la prématurité :
- L'hypertension intracrânienne ;
 - La détresse respiratoire ;
 - L'ictère néonatal ;
 - La rétinopathie.
30. Physiologiquement la tension artérielle, pendant le travail :
- Reste à la limite de la valeur normale ;
 - Baisse considérablement ;
 - Augmente surtout pendant la 2ème phase du travail ;
 - Augmente de 10 à 15 mm à chaque contraction.
31. Est considéré comme signes cliniques du syndrome de Sechane :
- L'agalactie ;
 - La fièvre ;
 - L'hémorragie ;
 - L'amblyopie.

32. En suites de couches, une phlébite non traitée peut évoluer vers :
- Une hémorragie ;
 - Une infection pelvienne ;
 - Une septicémie ;
 - Une embolie pulmonaire.
33. Les collections suppurées peuvent prendre une forme de :
- Septicémie ;
 - Abscès de Douglas ;
 - Pelvipéritonite puerpérale ;
 - Phlégmon du ligament large.
34. En suites de couches le segment inférieur disparaît pour devenir l'isthme utérin en :
- 5 jours ;
 - 4 jours ;
 - 3 jours ;
 - 2 jours.
35. L'incubation de l'agent causale de la poliomyélite est de :
- 1 à 18 jours ;
 - 7 à 18 jours ;
 - 7 à 12 jours ;
 - 9 à 12 jours.
36. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS 1997) définit la naissance normale comme une naissance :
- Dont le déclenchement est provoqué ;
 - A bas risque dès le début et tout au long du travail et de l'accouchement ;
 - Dont l'enfant (accouchement simple) naît spontanément en position céphalique du sommet ;
 - Qui a lieu entre les 37^e et 42^e semaines de gestation.
37. L'inversion utérine puerpérale aiguë :
- Est la pénétration à l'intérieur de la cavité utérine du fond de l'utérus qui se retourne « en doigt-de-gant » ;
 - Sa fréquence rapportée dans la littérature varie de 1/2000 à 1/20 000 accouchements ;
 - Son diagnostic doit être éliminé devant toute hémorragie du post-partum ;
 - Toutes les propositions précédentes sont justes.
38. Lors d'une visite prénatale chez une parturiente 2^{ème} parité âgée de 38ans, à 32 semaines d'aménorrhée, on constate les signes d'une infections urinaire, cochez la ou les propositions justes :
- Il faut en rechercher les signes comme ceux des infections cervicovaginales ;
 - On recherchera une parasitose (toxoplasmose) ;
 - Les antécédents de toxémie gravidique et de diabète gestationnel seront recherchés ;
 - L'infection urinaire est source d'accouchement prématuré et d'hypotrophie.
39. La contraception orale par oestroprogestatifs est contre-indiquée en cas de :
- Une hypertension artérielle ;
 - Une maladie immunitaire ;
 - Un antécédent de cancer mammaire ;
 - Toutes les propositions précédentes sont justes.
40. Quels sont les signes faisant craindre une crise d'éclampsie chez une femme enceinte de 36 semaines hypertendue :
- Des crampes ;
 - Des céphalées ;
 - Des douleurs épigastriques ;
 - Une fièvre.

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer

النموذج التالي للتحضير

نموذج مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 2025

Modèle de concours : Technicien – 3e grade – Ministère de
l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et
des Compétences 2025

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/390

Chaîne WhatsApp

قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Le site

الموقع

كل المباريات المفتوحة والنماذج مع التصحيح، مجاناً

Tous les concours ouverts et les sujets corrigés, gratuits

www.wadifa-info.com