



EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR L'ACCES AU GRADE
D'INFIRMIER DIPLOME D'ETAT PREMIER GRADE
SESSION : 30 OCTOBRE 2016
INFIRMIER POLYVALENT

1^{ère} épreuve

Durée : 3 heures

Coefficient : 1

INSTRUCTIONS POUR REpondre SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (Pour le nom et prénom en majuscule)
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

- Q1. Lesquelles des pathologies suivantes sont-elles classées non transmissibles:
- A. L'hypertension artérielle
 - B. Le diabète
 - C. L'anémie
 - D. L'hépatite
- Q2. Infarctus du myocarde se manifeste par :
- A. Douleur dans la partie centrale de la poitrine
 - B. Douleur dans le médiastin
 - C. Une douleur au niveau de l'épaule gauche
 - D. Une douleur au niveau du cou
- Q3. Le rhumatisme articulaire aigu peut se compliquer en :
- A. Insuffisance coronarienne
 - B. Une cardiopathie rhumatismale
 - C. Inflammation valvulaire
 - D. Inflammation du myocarde
- Q4. Une cardiopathie rhumatismale est une atteinte:
- A. Du myocarde
 - B. Des valves et du muscle cardiaque
 - C. Des valves ou du muscle cardiaque
 - D. De l'artère aorte
- Q5. Comme mesure de prévention secondaire des maladies cardiovasculaires on recommande:
- A. La prise d'aspirine
 - B. La prise de paracétamol
 - C. L'antibiothérapie
 - D. Toutes les réponses sont justes
- Q6. On parle de tension artérielle pincée lorsque:
- A. La tension différentielle est inférieure à cinq
 - B. La tension différentielle est supérieure à cinq
 - C. La tension différentielle est comprise entre cinq et dix
 - D. Aucune réponse
- Q7. On parle d'hypertension artérielle lorsque:
- A. La pression systolique dépasse 140mmHg
 - B. La pression diastolique dépasse 90mmHg
 - C. La pression systolique dépasse 140mmHg et La diastolique dépasse 90mmHg
 - D. La pression systolique est ≥ 140 mmHg et La diastolique est ≤ 90 mmHg



- Q8. Lors d'une corticothérapie à long terme, on peut observer:
- A. Une rétention hydrosodée
 - B. Un diabète cortisonique
 - C. Une ostéoporose
 - D. Une augmentation de la résistance de l'organisme aux infections
- Q9. Pour le dépistage des effets secondaires de la corticothérapie, l'infirmier doit rechercher, entre autres, chez le patient:
- A. des œdèmes, surtout des membres inférieurs
 - B. Des gastralgies
 - C. Des douleurs osseuses
 - D. des signes d'hyperkaliémie
- Q10. Les fractures fermées des membres sont classées dans :
- A. Les urgences dépassées ou troisièmes urgences
 - B. Les urgences différées ou deuxième urgences
 - C. Les urgences potentielles ou premières urgences
 - D. Les urgences absolues ou extrêmes urgences
- Q11. La démarche de soins est une méthode qui permet à l'infirmier de :
- A. Prendre en charge le patient avec efficacité
 - B. Poser un diagnostic infirmier
 - C. Identifier les besoins du patient
 - D. Répartir les tâches au sein d'une équipe soignante
- Q12. Le plan de soins infirmiers permet de:
- A. Assurer la continuité des soins
 - B. Assurer la traçabilité des soins
 - C. Evaluer la qualité des soins
 - D. Identifier le patient
- Q13. Le débit de la perfusion selon la prescription de 1 litre de sérum glucosé à 5% par 8 heures est de:
- A. 50 gouttes par minute
 - B. 42 gouttes par minute
 - C. 35 gouttes par minute
 - D. 70 gouttes par minute
- Q14. L'Acido-Cetose Diabétique est:
- A. une urgence médicale
 - B. Une décompensation métabolique du diabète type II.
 - C. Marquée par une hyperglycémie
 - D. Marquée par une cétonémie
- Q15. Parmi les signes cliniques de l'Acido-Cetose Diabétique on note:
- A. Une dyspnée acidotique de Kussmaul avec une mauvaise haleine
 - B. Une déshydratation importante
 - C. L'obnubilation de la conscience avec signes de pré-coma
 - D. L'hyperthermie
- Q16. L'hémoculture est réalisée au moment d'une décharge bactérienne se manifestant par:
- A. Une fièvre d'origine indéterminée (température > 38,5°)
 - B. Une hypothermie
 - C. Des frissons
 - D. Des signes cliniques faisant suspecter un sepsis sévère
- Q17. Pour éviter les faux négatifs d'une hémoculture:
- A. Prélever au moins 10 ml par flacon chez l'adulte et 2 ml chez l'enfant
 - B. Prélever au moins 2 ml par flacon chez l'enfant
 - C. Réaliser au moins 2 à 3 séries d'hémocultures par 24 heures
 - D. Réaliser un seul prélèvement par 24 heures

- Q18. Les contre-indications de l'injection intramusculaire:**
- A. Les troubles d'hémostase
 - B. Patient sous traitement anti-coagulant
 - C. Patient sous traitement corticoïde
 - D. Patient à jeun
- Q19. Une hypoglycémie se manifeste par :**
- A. Des sueurs
 - B. Des tremblements et asthénie brutale
 - C. Une anxiété
 - D. Bradycardie
- Q20. Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :**
- A. Coloration du faciès et des extrémités
 - B. Le dosage des gaz du sang
 - C. La fréquence respiratoire
 - D. La température du corps
- Q21. Les éléments de surveillance d'une trachéotomie sont :**
- A. Le rythme respiratoire
 - B. La perméabilité de la canule
 - C. La température du corps
 - D. La couleur, l'odeur et l'aspect des sécrétions
- Q22. La nutrition entérale chez l'adulte est:**
- A. L'alimentation par sonde de nutrition directement dans l'estomac
 - B. L'alimentation par sonde de nutrition directement dans le duodénum
 - C. L'alimentation par sonde de nutrition directement dans le jéjunum
 - D. L'alimentation par voie veineuse
- Q23. Un pansement peut avoir une propriété :**
- A. Cicatrisante
 - B. Désinfectante
 - C. Antalgique
 - D. Compressive
- Q24. Les déchets à éliminer systématiquement par la filière des déchets à risques infectieux sont :**
- A. Le matériel piquant ou coupant, dès son utilisation
 - B. Les flacons de produits sanguins à usage thérapeutique entamés ou périmés
 - C. Tout article de soins et tout objet souillé par du sang ou un autre liquide biologique
 - D. Les déchets ménagers
- Q25. Chez le diabétique, le dosage de l'hémoglobine glyquée permet de:**
- A. Vérifier l'équilibre du diabète
 - B. Vérifier l'efficacité du traitement
 - C. D'avoir une valeur de la glycémie
 - D. Connaître la glycémie sur une durée de trois mois
- Q26. Parmi les complications du diabète on note:**
- A. L'atteinte de la paroi des vaisseaux sanguins
 - B. Les rétinopathies diabétiques
 - C. Les néphropathies diabétiques
 - D. La neuropathie périphérique
- Q27. Le pied diabétique est:**
- A. Une ulcération du pied infecté chez le diabétique
 - B. Une ulcération du pied non infecté chez le diabétique
 - C. Une malformation
 - D. Due à la neuropathie périphérique
- Q28. La loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain, stipule dans son article 5:**
- A. Le prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes âgées de plus de 65 ans
 - B. Le prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes âgées de plus de 70 ans
 - C. Le prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes âgées de moins de 18 ans
 - D. Le prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes âgées de moins de 20 ans
- Q29. Parmi les produits sanguins labiles on note :**
- A. Le sang total
 - B. Le culot globulaire
 - C. Le culot plaquettaire
 - D. Le plasma frais congelé

- Q30. Le plasma frais congelé contient :**
- A. Des anticorps du donneur
 - B. Des antigènes du donneur
 - C. Des anticorps et antigènes du donneur
 - D. Aucune réponse
- Q31. Dans le cas d'une transfusion de plasma frais congelé (PFC):**
- A. Le plasma «AB» est utilisable quel que soit le groupe du receveur
 - B. Le plasma «O» est utilisable quel que soit le groupe du receveur
 - C. Le plasma A ou B est utilisable pour un receveur O
 - D. Le plasma A ou B est utilisable pour un receveur AB
- Q32. En cas d'erreur de compatibilité ABO lors d'une transfusion de PFC, on peut assister à:**
- A. Un accident hémolytique
 - B. Un choc anaphylactique
 - C. Un choc infectieux
 - D. Une surcharge volumique
- Q33. Les étapes préparatoires de la stérilisation sont :**
- A. Le tri et la pré-désinfection
 - B. Le nettoyage, le rinçage et le séchage
 - C. Le conditionnement
 - D. La destruction de tous les germes pathogènes ou non
- Q34. Pour préparer la stérilisation du matériel chirurgical, la pré-désinfection:**
- A. Sert à enlever les souillures collées au matériel
 - B. Sert à réduire les germes existants sur le matériel
 - C. Se fait au niveau du service d'utilisation
 - D. N'est pas une étape nécessaire
- Q35. En cas de fièvre chez l'enfant il faut :**
- A. Donner à boire à l'enfant, des boissons qu'il aime
 - B. Habiller l'enfant légèrement
 - C. L'installer dans une chambre non chauffée
 - D. Couvrir l'enfant en cas de frissons
- Q36. Parmi les signes suivants, lesquels présentent un danger chez l'enfant :**
- A. La fièvre
 - B. Les crises convulsives
 - C. Les problèmes respiratoires et cardio-vasculaires
 - D. La diarrhée modérée
- Q37. Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant les signes à rechercher sont:**
- A. La soif
 - B. La sécheresse des muqueuses
 - C. La persistance du pli cutané
 - D. La fièvre
- Q38. le rôle de l'infirmier dans les soins palliatifs est de:**
- A. Assurer l'accompagnement du patient
 - B. Assurer l'accompagnement global du patient et de son entourage
 - C. Assurer l'éducation du patient et de son entourage
 - D. Gestion de la douleur et le soutien psychologique et spirituel
- Q39. La gériatrie est:**
- A. La branche de la médecine qui étudie le processus biologique du vieillissement
 - B. Une spécialité médicale qui traite des maladies des personnes âgées
 - C. La branche de la médecine qui tente de résoudre les problèmes psychologiques, sociaux ou économiques des personnes âgées
 - D. Une spécialité médicale qui traite des maladies chroniques des personnes âgées
- Q40. Les accidents les plus fréquents chez la personne âgée sont:**
- A. La fausse route lors des repas
 - B. La fracture du col de fémur
 - C. La somnolence
 - D. Asphyxie

BON COURAGE

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer

النموذج التالي للتحضير

**نموذج الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى من إطار
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - ديداكتيك الفلسفة -
دورة 2025**

Modèle d'examen professionnel : accès au 1er grade,
professeur de l'enseignement secondaire qualifiant – CNEE –
didactique de la philosophie – session 2025

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/2132

Chaîne WhatsApp

قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Le site

الموقع

كل المباريات المفتوحة والنماذج مع التصحيح، مجاناً

Tous les concours ouverts et les sujets corrigés, gratuits

www.wadifa-info.com