1 Epreuve – Durée : 03 heures – Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

Q1/ Devant un corps étranger totalement obstructif, quels sont les gestes à entreprendre

A. Essayer le plus vite possible de retirer le corps étranger de la gorge du patient avec les doigts
B. Surtout ne faire aucun geste pour ne pas aggraver la situation déjà préoccupante
C. Appliquer plusieurs claques dans le dos pour provoquer l'expulsion du corps étranger
D. Faire la manœuvre de Heimlich si on en connaît le principe et la réalisation

Q2/ Chez quel type de patients une attention toute particulière devra être observée lors de l'administra d'oxygène

A. Les personnes en insuffisance cardiaque
B. Les personnes en insuffisance respiratoire chronique
C. Les personnes asthmatiques
D. Les personnes présentant des terrains allergiques

Q3/ Quelle précaution particulière devra être prise à l'égard des patients citée dans l'énoncé de la

A. Utiliser d'emblée des forts débits d'oxygène au moins > à 8 l/min
B. Utiliser des débits d'oxygène moyens compris entre 4 et 6 l/min
C. Privilégier des bas débits d'oxygène < à 2 l/min
D. Utiliser des débits d'oxygène moyens compris entre 4 et 8 l/min

Q4/ Quelle est la cause probable qu'il faut systématiquement évoquer de première intention fa patient présentant une douleur thoracique dans un contexte d'effort

A. L'origine pleuro-pulmonaire
B. L'origine traumatique

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5416 - Wadifa Info - page 1/18

Q3/ Quelle précaution p

A. Utiliser d'emblée des forts débits d'oxygène au moins > à 8 l/min
B. Utiliser des débits d'oxygène moyens compris entre 4 et 6 l/min
C. Privilégier des bas débits d'oxygène < à 2 l/min
D. Utiliser des débits d'oxygène moyens compris entre 4 et 8 l/min

Q4/ Quelle est la cause probable qu'il faut systématiquement évoquer de première intention face à un patient présentant une douleur thoracique dans un contexte d'effort

A. L'origine pleuro-pulmonaire
B. L'origine traumatique
C. L'origine cardiaque
D. L'origine vasculaire

Q5/ Comment reconnaissez-vous un arrêt cardio-respiratoire

A. Le patient est cyanosé
B. Le patient est inconscient
C. Le patient présente des pupilles dilatées
D. Le patient ne respire plus
E. Vous ne percevez pas de pouls central chez le patient

Q6/ A quelle fréquence doit-on réaliser les compressions thoraciques du massage cardiaque exte
l'adulte

A. 30 compressions / min
B. 60 compressions / min
C. 100 compressions / min
D. 150 compressions / min

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

B. C'est un blessé pré
vital
C. C'est un blessé présentant plusieurs traumatismes n'engageant pas forcement le pronostic vi
D. C'est un blessé présentant plusieurs fractures dont l'une engage le pronostic vital

9/ Quelle est la vocation du Plan Blanc

A. Mettre en place un protocole de désinfection de tous les services d'hospitalisation après u
d'infections nosocomiales
B. Organiser l'évacuation de l'hôpital dans les meilleures conditions suite à son incapacit
d'assurer la continuité des soins
C. Organiser la mobilisation humaine et matérielle des différents services de l'hôpital en c
de crise sanitaire exceptionnelle, ou face à un afflux massif de victimes

10/ Quel examen doit-on faire systématiquement devant une personne inconsciente ?

A. Un électro-encéphalogramme
B. Une mesure de la glycémie capillaire
C. Un électrocardiogramme
D. Une mesure des gaz du sang

11/ La stratégie du plan national de prévention et de contrôle du cancer repose sur les a

A. La prévention
B. La détection précoce
C. Les soins palliatifs
D. La PEC diagnostique et thérapeutique

et la PEC des cancers du sein et

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

de crise sanitaire exceptionnelle, ou face à un afflux massif de victimes

Q10/ Quel examen doit-on faire systématiquement devant une personne inconsciente ?

A. Un électro-encéphalogramme
B. Une mesure de la glycémie capillaire
C. Un électrocardiogramme
D. Une mesure des gaz du sang

Q11/ La stratégie du plan national de prévention et de contrôle du cancer repose sur les axes suivants

A. La prévention
B. La détection précoce
C. Les soins palliatifs
D. La PEC diagnostique et thérapeutique

Q12/ L'offre de soins concernant la détection précoce et la PEC des cancers du sein et du col utérin, s'organise

A. En deux niveaux
B. En trois niveaux
C. En quatre niveaux
D. En un seul niveau

Q13/ La population cible pour le dépistage du cancer du col de l'utérus concerne

A. Toutes les femmes âgées de 30 ans à 49 ans révolus avec l'exclusion des femmes ayant déjà eu cancer du col et des femmes enceintes à partir de la 8ème SA
B. Toutes les femmes âgées de 30 ans à 45 ans révolus avec inclusion des femmes ayant déjà eu un ca du col et des femmes enceintes à partir de la 8ème SA
C. Toutes les femmes âgées de 30 ans à 45 ans révolus avec l'exclusion des femmes ayant déjà cancer du col et des femmes enceintes à partir de la 8ème SA
D. Toutes les femmes âgées de 30 ans à 49 ans révolus avec inclusion des femmes ayant déjà eu un du col et des femmes enceintes à partir de la 8ème SA.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q14/ La supplémentation en Vitamine A chez un enfant de 15 mois atteint de Rougeole est de

A. Une dose de 100000 UI à J1, J2, J30
B. Une dose de 200000 UI à J1, J2, J30
C. Une dose de 100000 UI à J1, J5, J30
D. Une dose de 200000 UI à J1, J5, J30

Q15/ A la naissance, quel pourcentage des nouveau-nés exige au moins une quelconque intervention pour déclencher des mouvements respiratoires spontanés et réguliers

A. 1%
B. 3%
C. 10%
D. 20%

Q16/ Pendant que vous utilisez un ballon de ventilation, vous devez vous mettre

A. La tête ou aux pieds du nouveau-né
B. Sur le côté ou à la tête du nouveau-né
C. Sur le côté ou aux pieds du nouveau-né
D. Toutes les réponses

Q17/ La première dose du vaccin contre l'HB est administrée

A. Durant les 24 heures suivant l'accouchement
B. 48 heures après l'accouchement
C. Durant le premier mois
D. A partir du deuxième mois

Q18/ Entre le premier Rappel du vaccin anti DTC et le vaccin Pentavalent, il existe un intervalle de

A. 15 Mois
B. 16 Mois
C. 17 Mois

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

C. 17 Mois
D. Toutes les réponses sont fausses

Q19/ Dans le calendrier de la dentition définitive suivant, une date est fausse. Laquelle

A. Incisives 7 et 8 ans
B. Canines 9 ans
C. Prémolaires 9 et 11 ans
D. Premières molaire 6 ans

Q20/ Une candidose buccale peut être due à

A. Un traitement antibiotique à large spectre
B. Un traitement corticoïde
C. Un traitement immunodépresseur
D. Un traitement par neuroleptiques

Q21/ Le plan stratégique de lutte antituberculeuse (LAT) couvrant la période 2011-2015 et a
de réduire la charge de morbidité de la tuberculose dans la population marocaine, s'ap

A. 4 axes stratégiques
B. 5 axes stratégiques
C. 6 axes stratégiques
D. 7 axes stratégiques

Q22/ Une personne de groupe O il :

A. Possède l'Antigène A à la surface des hématies
B. Possède l'Antigène B à la surface des hématies
C. Possède l'Antigène A et l'Antigène B à la surface des hématies
D. Ne possède aucun de ces 2 Antigène à la surface des hématies.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5416 - Wadifa Info - page 6/18

Q23/ Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : une Hypertension artérielle, œdème pulmonaire, oppression thoracique, angoisse, toux, dyspnée, cyanose, expectoration. De quel accident transfusionnel s'agit t-il ?

A. Un accident de surcharge
B. Un accident de contamination
C. Un accident allergique
D. Un accident d'hémolyse

Q24/ Les précautions à prendre avant une transfusion sanguine sont :

A. Vérifier l'identité du patient
B. Vérifier la date de péremption, et l'aspect de la poche
C. Faire un contrôle pré transfusionnel
D. Ne jamais Réchauffer le sang

Q25- Les pansements ont une action :

A. cicatrisante.
B. désinfectante.
C. absorbante.
D. antalgique

Q26- un pansement compressif:

A. est un pansement qui exerce une pression sur une plaie.
B. est utilisé en cas de saignement
C. est utilisé en cas de douleur
D. ne doit pas être maintenue en place au-delà de 20 minutes.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q27- Les signes cliniques locaux d'une inflammation sont:

A. Rougeur
B. Chaleur
C. Douleur
D. Abcès

Q28- Les risques et complications des pansements sont :

A. Infection de la plaie
B. Saignement de la plaie
C. Pansements non adaptés, inefficaces
D. Apparition d'hématome

Q29- On reconnait une thrombophlébite par :

A. Dissociation pouls / T°
B. Dissociation TA / pouls
C. Rougeur du membre atteint
D. Fièvre légère

Q30/ Un choc septique est dû à :

A. Une hémorragie
B. Une insuffisance circulatoire d'origine infectieuse
C. Un choc vagal
D. Une diarrhée grave

Q31/ Les signes de gravité d'une détresse respiratoire chez un nourrisson sont :

A. Hyper ou hypothermie

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5416 - Wadifa Info - page 8/18

Q32/ Les paramètres qui doivent être surveillés dans les premières heures d'une réhydratation chez un nourrisson présentant une déshydratation avec collapsus, sont :

A. La modification du pli cutané
B. La fréquence des selles
C. La tension artérielle
D. La diurèse.

Q33/ Dans la comparaison entre le lait de femme et le lait de vache, une des propositions est inexacte laquelle ?

A. Le lait de femme contient plus de protéine que le lait de vache
B. Le lait de femme contient plus de sucre que le lait de vache
C. Le lait de femme contient autant de lipides que le lait de vache
D. Le lait de femme contient moins de calcium que le lait de vache

Q34- Parmi les types de diabète on note :

A. le diabète rénal
B. le diabète de type 1
C. le diabète de type 2
D. le diabète gestationnel

Q35- le diabète de type 1 veut dire :

A. diabète sucré caractérisée par une moindre sensibilité à l'insuline,
sucré chez la femme au cours de la grossesse

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

B. diabète sucré chez la femme au cours de la grossesse
C. diabète sucré du nouveau-né
D. diabète sucré caractérisé par la disparition des cellules produisant l'insuline

Q36- Le diabète est caractérisé par

A. Une glycosurie
B. Une protéinurie
C. Une polyurie
D. Une polydipsie

Q37- En cas d'hypoglycémie

A. la glycémie est très basse (< 0,4 à 0,6 g / l)
B. biologiquement, la glycémie est en dessous de 0,5 g/l
C. la glycémie capillaire détermine à elle seule la glycémie,
D. surveiller les signes de coma

Q38/ La douleur typique d'un ulcère gastroduodénal

A. Est perçue à type de crampe
B. Est calmée par l'alimentation
C. Est permanente durant la journée
D. Est calmée par l'anti-flexion du tronc

Q39/ Dans les brûlures les surfaces sont estimées à:

A. 18% tête et cou
B. 9% pour le membre supérieur
C. 27% pour les faces antérieurs et postérieurs du tronc

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

A. la glycémie est très basse (< 0,4 à 0,6 g / l)
B. biologiquement, la glycémie est en dessous de 0,5 g/l
C. la glycémie capillaire détermine à elle seule la glycémie,
D. surveiller les signes de coma

Q38/ La douleur typique d'un ulcère gastroduodénal

A. Est perçue à type de crampe
B. Est calmée par l'alimentation
C. Est permanente durant la journée
D. Est calmée par l'anti-flexion du tronc

Q39/ Dans les brûlures les surfaces sont estimées à:

A. 18% tête et cou
B. 9% pour le membre supérieur
C. 27% pour les faces antérieurs et postérieurs du tronc
D. 9% pour les organes génitaux

Q40/ La vaccination par le BCG est contre indiqué e en cas de :

A. Diabète
B. Eczéma en période suintante
C. SIDA maladie
D. Réaction cutanée tuberculinique positive

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5416 - Wadifa Info - page 11/18

Q41/ Signes généraux des hémorragies:

A. pouls rapide, filant, peu perceptible
B. respiration rapide et superficielle
C. pâleur, moiteur ou sueurs
D. tachycardie

Q42/ Les éléments à prendre en considération pour le diagnostic de la diarrhée chez l'enfant sont :

A. Nombre de selles quotidiennes
B. aspect, consistance, couleur, odeur des selles
C. présence de corps étrangers
D. ancienneté de la diarrhée, horaire

Q43/ Dans le cas d'un OAP :

A. mettre le malade en position demi assise
B. mettre le malade en position assise, jambes pendantes
C. mettre le malade en position latérale gauche
D. mettre le malade en position assise

Q44/ Les complications d'une perfusion sont :

A. Hématome
B. Lymphangite
C. L'escarre
D. Accident de surdosage

Q45/ Les indications de l'hémodialyse sont :

A. Insuffisance rénale aiguë
B. Intoxications médicamenteuses
C. Rétention hydro-sodée sévère d'origine insuffisance cardiaque
D. Troubles sévères de la thermorégulation

Q46/ Durant la dialyse, les éléments à surveiller chez le patient sont :

A. La perte de poids

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

D. Troubles sévères de la thermorégulation

Q46/ Durant la dialyse, les éléments à surveiller chez le patient sont :

A. La perte de poids
B. La tension artérielle et le pouls
C. La température
D. L'abord veineux

Q47/ L'abord veineux l'hémoptysie est le rejet de sang provenant de :

A. l'estomac
B. des poumons
C. du carrefour aéro-digestif
D. des bronches

Q48/ Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A. La méningite purulente
B. Les infections ORL
C. L'abcès du cerveau
D. Le traumatisme crânien

Q49/ Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant les signes à rechercher sont :

A. La soif
B. la sécheresse des muqueuses
C. la persistance du pli cutanée
D. la fièvre

Q50/ on parle de déshydratation grave chez l'enfant lorsque la perte de poids :

A. Inférieure à 10%
B. Dépasse les 10%
C. Inférieure à 5%
D. Dépasse 5%

Q51/ Les signes de danger les plus fréquents chez l'enfant sont :

A. La fièvre et crises convulsives

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q48/ Les causes de convulsions

A. La méningite purulente
B. Les infections ORL
C. L'abcès du cerveau
D. Le traumatisme crânien

Q49/ Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant les signes à rechercher sont :

A. La soif
B. la sécheresse des muqueuses
C. la persistance du pli cutanée
D. la fièvre

Q50/ on parle de déshydratation grave chez l'enfant lorsque la perte de poids

A. Inférieure à 10%
B. Dépasse les 10%
C. Inférieure à 5%
D. Dépasse 5%

Q51/ Les signes de danger les plus fréquents chez l'enfant sont :

A. La fièvre et crises convulsives
B. Le vomissement
C. Les problèmes respiratoires et cardio-vasculaires
D. La diarrhée modérée

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5416 - Wadifa Info - page 14/18

Q52/ Ce qu'il faut faire en cas de fièvre chez l'enfant :

A. Donner à boire à l'enfant, des boissons qu'il aime
B. Habiller l'enfant légèrement
C. L'installer dans une chambre non chauffée
D. Couvrir l'enfant en cas de frissons

Q53/ les précautions à prendre au cours de l'oxygénothérapie sont :

A. Ne jamais allumer de flamme ou fumer à proximité
B. graisser le matériel
C. Vérifier de temps en temps le débit
D. Vérifier souvent le niveau d'eau à l'intérieur de l'humidificateur

Q54/ Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A. Coloration du faciès et des extrémités
B. Le dosage des gaz du sang
C. La fréquence respiratoire
D. La température du corps

Q55/ Un dysfonctionnement respiratoire est repéré par :

A. une modification anormale de la concentration de l'oxygène dans le sang artériel
B. une modification anormale de la concentration de l'oxygène dans le sang veineux
C. une modification anormale de la concentration de l'O2 et CO2 dans le sang artériel
D. une modification anormale de la concentration de l'O2 et CO2 dans le sang veineux

Q56/ l'intubation trachéale est nécessaire quand:

n'est plus assurée par le patient

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q55/ Un dysfonctionnement respiratoire est repéré par :

A. une modification anormale de la concentration de l'oxygène dans le sang artériel
B. une modification anormale de la concentration de l'oxygène dans le sang veineux
C. une modification anormale de la concentration de l'O2 et CO2 dans le sang artériel
D. une modification anormale de la concentration de l'O2 et CO2 dans le sang veineux

Q56/ l'intubation trachéale est nécessaire quand:

A. La ventilation n'est plus assurée par le patient
B. La ventilation est assurée par le patient mais la protection des voies ne se fait plus
C. Le patient souffre d'une douleur thoracique
D. Le patient présente une insuffisance respiratoire

Q57/ La fréquence des soins d'une trachéotomie est fonction de :

A. la quantité et de la fluidité des sécrétions
B. la souillure du pansement
C. Sur demande du patient
D. La présence de signes d'obstruction des voies aériennes

Q58/ Lesquels des éléments suivant sont à surveiller dans une trachéotomie :

A. La perméabilité
B. Les secrétions
C. Le confort du patient
D. Les signes de décanulation ou de bouchon

déclarer chez le malade hospitalisé :

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

le patient présente une insuffisance respiratoire

Q57/ La fréquence des soins d'une trachéotomie est fonction de :

A. la quantité et de la fluidité des sécrétions
B. la souillure du pansement
C. Sur demande du patient
D. La présence de signes d'obstruction des voies aériennes

Q58/ Lesquels des éléments suivant sont à surveiller dans une trachéotomie :

A. La perméabilité
B. Les secrétions
C. Le confort du patient
D. Les signes de décanulation ou de bouchon

Q59/ Une infection nosocomiale peut se déclarer chez le malade hospitalisé :

A. Le jour de son hospitalisation
B. 24 heures après son hospitalisation
C. 48 heures après son hospitalisation
D. 48 heures après sa sortie de l'hôpital

Q60/ L'hémodialyse consiste à :

A. Une épuration artificielle du sang du malade
B. Un échange entre le sang et le dialysat
C. Epuration des déchets et normalisation des électrolytes plasmatiques
D. Régulariser la tension artérielle

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - ديداكتيك الفلسفة -

Modèle d'examen professionnel : accès au 1er grade, professeur de l'enseignement secondaire qualifiant – CNEE –

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/2132

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me