

Épreuve de Mathématique

Samedi 02 Août 2014- Durée 2h00

I - QUESTIONS À RÉPONSES PRÉCISES

Une réponse correcte = **2pt**, pas de réponse **ou** une réponse fausse = **0pt**

	Questions	Réponses	Notes
Q1 2pt	Calculer la limite de la suite $(u_n)_n$ définie par: $u_n = \frac{n}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{n}{\sqrt{n^4+2}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}}$	$\lim_n u_n =$	
Q2 2pt	Déterminer, dans $[0, 2\pi]^2$, l'ensemble S des solutions du système: $\begin{cases} \sqrt{2} \cos x - \cos x \cos y = \frac{1}{2} \\ \sin x + \cos y = \sqrt{2} \end{cases}$	$S =$	
Q3 2pt	Déterminer la forme algébrique de: $z = \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}} - i \sqrt{2 + \sqrt{3}} \right)^{42}$	$z =$	
Q4 2pt	Déterminer, Γ , l'ensemble des points du plan complexe dont les affixes z vérifient: $(iz + 1)(z + i - 1) \in i\mathbb{R}$	Γ est	
Q5 2pt	Soit $a \in]0, \pi[$. Calculer $D = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$	$D =$	
Q6 2pt	Calculer: $A_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$	$A_n =$	
Q7 2pt	Calculer $\ell = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + 2 + 3 + \dots + E\left(\frac{1}{ x }\right) \right)$	$\ell =$	
Q8 2pt	Évaluer la limite $j = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[4]{x+1}}{x}$	$j =$	
Q9 2pt	Trouver toutes les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telles que: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}, f(x^4 + y) = x^3 f(x) + f(y)$	$f(x) =$	
Q10 2pt	Soit g la fonction définie par $\forall x \in]0, \pi[\quad g(x) = \cos x \sqrt{1 - \cos x}$ Calculer $g'(x)$ en fonction $g(x)$, $\forall x \in]0, \pi[\setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$	$g'(x) = \dots$	
Q11 2pt	Soit h définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $h(x) = \ln e^x - e^{2x} $ Déterminer h^{-1} .	$\forall x \in D_{h^{-1}} = \dots, \dots$ $h^{-1}(x) = \dots$	
Q12 2pt	Calculer $K = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 \frac{\text{Arctan}(x)}{x^2} dx$	$K =$	
Q13 2pt	calculer l'intégrale $L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$	$L =$	
Q14 2pt	Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' + 10y = \sin 3x, \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} y(t) dt = 0, y'(\pi) = \frac{6}{37}$	$y(x) =$	
Q15 2pt	Résoudre, dans $\mathbb{N}^2$, l'équation $x^2 - y^2 = 404$	$S =$	

II - QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES

Une réponse correcte = **2pt**, pas de réponse = **0pt**, plus d'une réponse ou une réponse fausse = **-1pt**.

Q16: Pour quelles valeurs de m la matrice $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2m \\ 1 & -m+1 & 1 \\ 2 & 3 & m \end{pmatrix}$ est inversible:

- | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| A | B | C | D |
| -1 et un nombre négatif | uniquement -1 | -1 et un nombre positif | -1 et $\frac{1}{2}$ |

Q17: Sur $[0, +\infty[$, la fonction f définie par $f(x) = |x| + \ln(x+1)$ est:

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| A | B | C | D |
| toujours positive | positive puis négative puis positive | négative puis positive | aucunes des trois réponses |

Q18: Soit f définie par $f(0) = \frac{1}{e}$, $f(e) = 0$ et $f(x) = e^{\frac{1+\ln x}{1-\ln x}}$. Alors sa courbe C_f admet:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| A | B | C | D |
| une asymptote oblique en $+\infty$ | en $x = e$ une demi tangente à gauche | en $x = e$ une demi tangente à droite verticale | aucunes des trois réponses |

Q19: Dans une boîte se trouvent 14 jetons portant chacun une lettre du nom "SAHARA MAROCAIN". On tire successivement et sans remise 5 jetons. Quelle est la probabilité pour que l'on tire les lettres du nom "SMARA" dans un ordre quelconque?

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| A | B | C | D |
| $\frac{1}{6006}$ | $\frac{10}{1001}$ | $\frac{50}{14^5}$ | aucunes des trois réponses |

Q20: Une boîte B_1 contient 2 jetons numérotés: 1, 3. Une boîte B_2 contient 2 jetons numérotés: 2, 2. Une boîte B_3 contient 2 jetons numérotés: 1, 0. On tire au hasard un jeton a de B_1 , un jeton b de B_2 , un jeton c de B_3 . Quelle est la probabilité pour que l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet des racines réelles?

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D |
| 0,5 | 0,25 | 0,75 | 1 |

Q21: Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les deux points $A(-1,1,1)$ et $B(7, -5,5)$. Soit S la sphère dont l'un des diamètre est le segment $[AB]$. Le plan tangent à S au point $C(1,1-1)$ est:

- | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| $2x - 3y + 4z + 5 = 0$ | $4x + 3y + 2z - 5 = 0$ | $2x + 2y - z - 5 = 0$ | $4x + 2y + 2z - 5 = 0$ |

Q22: Soit $(u_n)_n$ la suite de terme général $u_n = \int_0^1 \frac{e^{nx}}{1+e^x} dx$. Alors

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| A | B | C | D |
| $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{e^n} = +\infty$ | $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{e^n} = 0$ | $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{e^n} = 1$ | aucunes des trois réponses |

Q23: Soit E l'espace vectoriel défini par: $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y + z + t = 0 \text{ et } 2x + y = 0\}$. Quelle est la dimension de E ?

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------------------------|
| A | B | C | D |
| 1 | 2 | 3 | aucunes des trois réponses |

Q24: Combien l'équation $\tan x + \tan 2x + \tan 3x + \tan 4x = 0$ possède-t-elle de solutions dans $[0, \frac{2\pi}{3}]$?

- | | | | |
|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| Cinq solutions | Six solutions | Sept solutions | Plus que sept solutions |

Q25:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2^k \pi}{2^n - 1}\right)$$

- | | | | |
|----------|----------|-----------|---------------------------|
| A | B | C | D |
| 0 | 1 | $+\infty$ | cette limite n'existe pas |