ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé

المملكة المغربية
وزارة الصحة

مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

المعامل: 2 | المدة الزمنية: ساعة ونصف | المادة: الفيزياء

MB – RAD – OPS - ORTHP

INSTRUCTIONS AVANT DE REPONDRE AUX QUESTIONS

- Les téléphones portables et les machines à calculer sont **strictement interdits** ;
- Toute introduction de téléphone portable ou d'appareil électronique (montre, calculette, Watch, etc.) ou de documents ou toute tentative de fraude entraînera automatiquement **l'exclusion du candidat** ;
- Tout candidat n'est autorisé à quitter la salle qu'après **une demi-heure** du début de l'épreuve ;
- Vérifier que le polycopié de l'épreuve contient **deux épreuves**, et le nombre total de questions est de **soixante**, numérotées de 1 à 60 (recto verso) ;
- Répondre sur **la grille de réponses nominative et individuelle**, en cochant la ou les cases correspondantes à la ou les bonnes réponses ;
- Seuls les **stylos à bille** de couleur **noire** ou **bleue** sont autorisés ;
- Le candidat doit cocher la réponse exacte sur la case correspondante de **manière lisible sans déborder** de la case prévue pour réponse ☒ ou ■ ;
- Remettre **la grille de réponses** avec **les copies contenant les questions de l'épreuve écrite**, aux membres de la commission de surveillance ;
- La durée de l'épreuve écrite est de **2h30min continue** (1h30min pour la 1ère épreuve, et 1h pour la 2ème épreuve).

Q1 : Un noyau de carbone $^{14}_{6}C$ contient :

a) 6 protons.
b) 6 neutrons.
c) 8 neutrons.
d) 6 électrons.

س1: تحتوي نواة الكربون $^{14}_{6}C$ على:

a) 6 بروتونات.
b) 6 نيوترونات.
c) 8 نيوترونات.
d) 6 الكترونات.

Q2 : Un noyau d'azote $^{14}_{7}N$ contient :

a) 14 protons et 7 neutrons, donc 7 nucléons.
b) 14 neutrons et 7 protons, donc 7 nucléons.
c) 7 protons, 7 neutrons et 14 nucléons.
d) 7 protons et 7 neutrons, donc 14 nucléons.

س2: تحتوي نواة النيتروجين $^{14}_{7}N$ على:

a) 14 بروتونات و 7 نيوترونات، أي 7 نيوكليونات.
b) 14 نيوترونات و 7 بروتونات، أي 7 نيوكليونات.
c) 7 بروتونات و 7 نيوترونات و 14 نيوكليونات.
d) 7 بروتونات و 7 نيوترونات أي 14 نيوكليون.

Q3 : Le rayonnement γ est :

a) Un électron.
b) Un rayonnement de très courte longueur d'onde.
c) Un rayonnement de très grande longueur d'onde.
d) Une onde électromagnétique.

س3 : الإشعاع γ هو:

a) إلكترون.
b) إشعاع ذو طول موجي قصير جدا.
c) إشعاع ذو طول موجي طويل جدا.
d) موجة كهرومغنطيسية.

Q4 : Quelles sont les notations correctes ?

a) $\frac{1}{2}n$
b) $\frac{1}{0}n$
c) $\frac{1}{0}n$
d) $\frac{1}{1}p$

س4: ما هي الرموز الصحيحة؟

335 شارع محمد الخامس الرباط الهاتف: +212 537 76 11 21 - الفاكس: +212 537 76 38 95
335, Av. Mohammed V, Rabat - Tél. : +212 537 76 11 21 - Fax : +212 537 76 38 95 www.sante.gov.ma

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3090 - Wadifa Info - page 1/8

Q5 : Lors d'une réaction nucléaire, quelles sont les grandeurs qui sont conservées :

a) Le nombre total de protons
b) La charge électrique totale
c) Le nombre total de neutrons
d) Le nombre total de nucléons

Q6 : Quelle est (sont) la (les) relation(s) correcte(s) ?

a) $A(t) = \frac{dN}{dt}$

b) $A(t) = -\frac{dN}{dt}$

c) $A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$

d) $A(t) = -\lambda N_0 e^{-\lambda t}$

Q7 : Que faut-il mettre à la place des pointillés pour que l'équation suivante soit correcte ?

$\ldots \rightarrow {}^{239}_{93}Np + {}^{0}_{-1}e$

a) ${}^{239}_{94}Pu$

b) ${}^{239}_{92}U$

c) ${}^{239}_{93}Np$

d) ${}^{239}_{94}Np$

Q8 : Choisir les isotopes :

a) ${}^{12}_{6}C$

b) ${}^{14}_{6}C$

c) ${}^{14}_{7}N$

d) ${}^{16}_{8}O$

Q9 : L'énergie libérée par la réaction nucléaire suivante :

$${}^{238}_{92}\mathbf{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathbf{Th} + {}^{4}_{2}\mathbf{He}$$

a) $\left[m\left({}^{234}_{90}Th\right) - m\left({}^{4}_{2}He\right) - m\left({}^{238}_{92}U\right)\right]c^2$

b) $\left[m\left({}^{238}_{92}U\right) + m\left({}^{4}_{2}He\right) - m\left({}^{234}_{90}Th\right)\right]c^2$

c) $\left[m\left({}^{238}_{92}U\right) + m\left({}^{4}_{2}He\right) - m\left({}^{234}_{90}Th\right)\right]c$

d) 28 eV

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3090 - Wadifa Info - page 2/8

Q10 : Le noyau issu de la désintégration α du noyau $^{214}_{84}Po$:

a) Z = 86 et A = 214
b) Z = 82 et A = 210
c) Z = 84 et A = 214
d) Z = 80 et A = 210

س10: النواة الناتجة عن تفكك α للنواة $^{214}_{84}Po$ لها:

Q11 : La radioactivité β⁻ correspond à l'émission d'un :

a) $^{1}_{1}e$
b) $^{0}_{1}e$
c) $^{1}_{0}H$
d) $^{3}_{2}He$

س11: النشاط الاشعاعي β⁻ هو انبعاث :

Q12 : Un échantillon a une radioactivité de 1000 Bq. Le nombre de noyaux désintégrés en une minute est :

a) 100
b) 3000
c) 600
d) 60000

س12 : عدد النوى المفككة في دقيقة واحدة لعينة نشاطها الاشعاعي 1000 Bq هو:

Q13 : L'expression correcte pour le défaut de masse d'un noyau est:

س13: التعبير الصحيح عن النقص الكتلي للنواة هو:

a) $(\Delta m)_{noyau} = (Am_p + (A-Z)m_n) - m_{noyau}$

b) $(\Delta m)_{noyau} = \dfrac{(Zm_p + (A-Z)m_n) - m_{noyau}}{A}$

c) $(\Delta m)_{noyau} = |(Zm_p + (A-Z)m_n) - m_{noyau}|$

d) $(\Delta m)_{noyau} = (Zm_p + (A-Z)m_n) - m_{noyau}$

Q14 : Une onde mécanique peut se propager :

a) Dans un milieu matériel.
b) Dans le vide.
c) Dans toutes les directions possibles.
d) Sans propagation d'énergie.

س14 : يمكن لموجة ميكانيكية أن تنتشر:

a) في وسط مادي
b) في الفراغ
c) في جميع الاتجاهات الممكنة
d) دون انتقال الطاقة

Q15 : La vitesse de propagation d'une onde dans une corde diminue quand :

a) La masse linéique de la corde est grande.
b) La masse linéique de la corde est petite.
c) La tension de la corde augmente.
d) La tension de la corde diminue.


س15 : تنخفض سرعة انتشار الموجة الميكانيكية طول الحبل عندما:

a) تكون الكتلة الطولية للحبل كبيرة
b) تكون الكتلة الطولية للحبل صغيرة
c) يكون توتر الحبل كبير
d) يكون توتر الحبل صغير

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

س16 : التشويه الذي ينتقل طول النابض ينتج عنه :

Q16 : La perturbation qui se propage le long du ressort produit :



a) Une onde transversale
b) Une onde longitudinale.
c) Une onde mécanique.
d) Une onde mécanique progressive

a) موجة مستعرضة
b) موجة طولية
c) موجة ميكانيكية
d) موجة ميكانيكية متوالية

س17 : بالنسبة لموجة ميكانيكية متوالية دورية ، فإن العلاقة التي تربط طول الموجة λ ، بالسرعة c والدور T هي:

Q17 : Pour une onde mécanique progressive périodique, la relation qui relie la longueur d'onde λ, la célérité c et la période T est :

a) $\lambda = \frac{c}{T}$

b) $\lambda = c + T$

c) $\lambda = c.T$

d) $\lambda = c.T^2$

س18 : العلاقة بين طول الموجة λ والدور T :
← السرعة : v و التردد : N

Q18 : La relation entre la longueur d'onde λ et la période T :
→ v : vitesse et N : fréquence :

a) $\lambda = v.T$

b) $\lambda = \frac{v}{N}$

c) $\lambda = \frac{N}{v}$

d) $\lambda = N.T$

س19 : تكون موجة ميكانيكية متوالية جيبية ذات المعادلة الزمنية تكتب على شكل:
← φ_0 : تيض الحركة

Q19 : Une onde mécanique progressive est sinusoïdale si l'équation de temps s'écrit :
→ ω : pulsation :

a) $Y_M(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$


b) $Y_M(t) = A\cos(\omega t - \varphi_0)$

c) $Y_M(t) = A\cos(\frac{2\pi}{T}t - \varphi_0)$

d) $Y_M(t) = A\cos(\frac{2\pi}{T}t - \varphi_0)$

س20 : يمثل الرسم المبياني حبلا يتذبذب بشكل دوري :

Q20 : Le schéma représente une corde oscillant périodiquement :



a) Les points A et D sont en phase
b) Les points B et E sont en phase
c) Les points C et F sont en phase
d) Les points A et E sont en phase

a) النقطتان A و D تهتزان على توافق في الطور
b) النقطتان B و E تهتزان على توافق في الطور
c) النقطتان C و F تهتزان على توافق في الطور
d) النقطتان A و F تهتزان على تعاكس في الطور

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3090 - Wadifa Info - page 4/8

Q21 : L'onde mecanique sinusoïdale se propage avec une vitesse v présente :

a) Une périodicité spatiale λ.
b) Une périodicité temporelle T
c) Une périodicité spatiale λ et temporelle T
d) Une longueur d'onde λ = v.T .

س21 : موجة ميكانيكية جيبية تنتشر بسرعة v لها:

a) دورية مكانية λ
b) دورية زمانية T
c) دورية مكانية λ و زمانية T
d) طول الموجة λ = v.T

Q22 : Une onde périodique :

a) Est toujours sinusoïdale
b) Peut-être non sinusoïdale.
c) Peut-être une onde mécanique
d) Peut-être une onde mécanique et sinusoïdale.

س22: الموجة الدورية:

a) تكون دائما جيبية
b) يمكن أن لا تكون جيبية
c) يمكن أن تكون موجة ميكانيكية
d) يمكن أن تكون موجة ميكانيكية وجيبية

Q23 : La diffraction d'une onde progressive sinusoïdale dans le même milieu, ne modifie pas :

a) Sa longueur d'onde
b) Sa fréquence
c) Sa vitesse.
d) Sa période

س23 : حيود الموجة المتوالية الجيبية في نفس الوسط لا يغير:

a) طولها الموجي
b) تردداها
c) سرعتها
d) الدور الزمني

Q24 : Lorsqu'une radiation lumineuse de longueur d'onde λ traverse une fente de largeur a, l'écart angulaire θ :

a) $\theta = \frac{\lambda}{a}$

b) $\theta = \frac{a}{\lambda}$

c) $\theta = \frac{1}{a\lambda}$

d) $\theta = \lambda . a$

س24: عندما يمر شعاع ضوئي بطول موجي λ عبر فتحة عرضها a، فإن الانحراف الزاوي θ :

Q25 : L'écart angulaire de diffraction θ est plus important pour une onde de longueur d'onde :

a) 400 nm.
b) 580 nm.
c) 680 nm.
d) 700 nm

س25 : يكون الانحراف الزاوي θ أكبر لموجة طولها الموجي:

Q26 : Un faisceau laser a une longueur d'onde dans le vide λ = 600 nm. Il traverse un prisme d'indice n = 1,58. Lorsque le faisceau se propage dans l'air sa fréquence est :

a) $6\ 10^{14}$ Hz.
b) $5\ 10^{14}$ Hz.
c) $0,5\ 10^{-3}$ s^{-1}
d) $0,5\ 10^{-3}$ s

س26 : شعاع الليزر طول موجته في الفراغ λ = 600 nm يمر عبر منشور معامله n = 1,58 ، عندما تنتشر الحزمة في الهواء يكون ترددها:

Q27 : Un faisceau laser a une longueur d'onde dans le vide λ = 600 nm. Il traverse un prisme d'indice n = 1,58. Lorsque le faisceau se propage dans l'air sa période T est :

a) $\approx 10^{15}$ m
b) $5\ 10^{15}$ m^{-1}
c) $5\ 10^{-5}$ s
d) $2\ 10^{-15}$ s

س27 : شعاع الليزر طول موجته في الفراغ λ = 600 nm يمر عبر منشور معامله n = 1,58 ، عندما تنتشر الحزمة في الهواء يكون الدور الزمني T :

Q28 : Une onde lumineuse se propage à 200000 km/s dans un milieu transparent. L'indice de ce milieu est :

a) 1
b) 1,5
c) 2
d) 2,5

س28 : تنتشر موجة ضوئية في وسط شفاف بسرعة 200000 km/s يكون معامل الوسط هو :

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q29 : Lorsqu'un faisceau parallèle de lumière de longueur d'onde $\lambda = 620$ nm traverse une fente de largeur $a = 0,1$ mm, l'écart angulaire θ :

a) 0,00062 radians
b) 0,3554°
c) 620 radians/s
d) 0,345 m/s

س29 : عندما يمر شعاع ضوئي أحادي اللون بطول موجي $\lambda = 620$ nm عبر فتحة عرضها $a = 0,1$ mm فإن الانحراف الزاوي θ :

a) 0,00062 راديان
b) 0,3554°
c) 620 راديان/ث
d) 0,345 م/ث

Q30 : L'œil humain est capable de voir des rayonnements dont la longueur d'onde est comprise entre :

a) 400 nm et 700 nm
b) 600 nm et 800 nm
c) 230 nm et 330 nm
d) 300 nm et 370 nm

س30 : يستطيع العين البشرية رؤية الاشعاع بطول موجي بين:

Q31 : Lorsque un faisceau monochromatique traverse un prisme, il se forme :

a) Plusieurs couleurs.
b) Une seule couleur
c) Une seule couleur sans déviation.
d) La couleur rouge

س31 : عندما يمر شعاع من الضوء الأبيض عبر منشور، نلاحظ تكون:

a) مجموعة من الألوان.
b) لون واحد
c) لون واحد بدون انحراف
d) اللون الأحمر.

Q32 : Lorsque un rayon incident arrive avec un angle i_1 sur une surface séparant deux milieux 1 et 2 transparents d'indice de réfraction respectivement n_1 et n_2, les deux rayons incident et réfracté se trouvent dans :

a) Le même plan.
b) Des plans différents.
c) Le même milieu.
d) Les milieux 1 et 2 respectivement

س32 : عند اجتياز شعاع وارد بزاوية i_1 السطح الفاصل بين وسطين 1 و 2 شفافين معاملا انكسارهما على التوالي n_1 و n_2 الشعاعان الوارد والمنكسر يوجدان في:

a) نفس المستوى.
b) مستويات مختلفة.
c) نفس الوسط.
d) الوسطين 1 و 2 على التوالي

Q33 : La loi de Descartes :

a) $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

b) $n_1 \sin i_2 = n_2 \sin i_1$

c) $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin i_1}{\sin i_2}$

d) $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin i_2}{\sin i_1}$


س33 : قانون ديكارت:

Q34 : Un rayon lumineux peut subir une réflexion totale en passant d'un milieu d'indice n_1 avec une vitesse v_1 à un milieu d'indice n_2 avec une vitesse v_2 quand :

a) $n_1 > n_2$
b) $n_1 < n_2$
c) $v_1 < v_2$
d) $v_1 > v_2$

س34 : يمكن لشعاع ضوئي أن يخضع لانعكاس كلي أثناء مروره من وسط معامل انكساره n_1 بسرعة v_1 إلى وسط معامل انكساره n_2 بسرعة v_2 عندما:

Q35 : Un rayon lumineux arrive sur un prisme en verre placé dans l'air. Quelle est la trajectoire correcte du rayon ?




a) A
b) B
c) C
d) D

س35 : ما هو المسار الصحيح لشعاع ضوئي يخترق منشور زجاجي يوجد في الهواء؟

wadifa-info.com
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q36 : L'élément numéroté "1" sur la figure ci-dessous représente :

س36 : يمثل العنصر المرقم "1" في الشكل أعلاه:



a) La surface de séparation.
b) La normale à la surface de séparation.
c) Le rayon incident.
d) L'angle d'incidence.

a) السطح الكاسر
b) المنظمي للسطح الكاسر
c) الشعاع الوارد
d) زاوية الورود

Q37 : L'élément numéroté "2" sur la figure ci-dessus représente :

a) La surface de séparation.
b) La normale à la surface de séparation.
c) Le rayon incident.
d) L'angle d'incidence.

س37 : يمثل العنصر المرقم "2" في الشكل أعلاه:

a) السطح الكاسر
b) المنظمي للسطح الكاسر
c) الشعاع الوارد
d) زاوية الورود

Q38 : Lorsqu'un rayon de lumière arrive avec un angle de 0° sur la surface de séparation entre l'air et l'eau :


a) Il est dévié.
b) Il n'est pas dévié.
c) Il est dévié avec un angle de 45°.
d) Il est dévié avec un angle de 65°.

س38 : عندما يصل شعاع ضوء بزاوية 0° على السطح الفاصل بين الهواء والماء:

a) ينحرف
b) لا ينحرف
c) ينحرف بزاوية 45°
d) ينحرف بزاوية 65°

Q39 : Dans le cas où un prisme d'indice n = 1,5 et d'angle au sommet A = 60° se trouve plongé dans l'air d'indice égal à 1 ; nous avons les relations :

س39 : عندما يوجد منشور معامله 1,5 = n وزاوية راسه A = 60° مغمور في الهواء الذي يساوي معامله 1 تكون لدينا العلاقات:



a) $\sin i = n \sin r$
b) $A - r - r' = 0$
c) $n \sin r' = \sin i'$
d) $D = i + i' - A$

Q40 : Dans le cas où un prisme d'indice n = 1,5 et d'angle au sommet A = 60° se trouve plongé dans l'air d'indice égal à 1 ; nous avons les relations :

س40 : عندما يوجد منشور معامله 1,5 = n وزاوية راسه A = 60° مغمور في الهواء الذي يساوي معامله 1 تكون لدينا العلاقات:

a) $\sin i = n \sin r$
b) $i - r' = 60$
c) $n \sin r' = \sin i$
d) $D = i - i' - A$

BON COURAGE

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3090 - Wadifa Info - page 7/8

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — النموذج التالي للتحضير

نموذج مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - دورة 26 نونبر 2016 -

Modèle de concours d'accès au cycle de formation initiale – École Nationale Supérieure de l'Administration – 26 novembre

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/640

Chaîne WhatsApp — قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — قناة يوتيوب

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — أرسل النموذج لصديق

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me