



امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين و تقنيي الصحة

الإطار: إطار القابلات الاختصاص: القابلات المدة: ساعتان المعامل: 2

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (Pour le nom et prénom en majuscule)
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1 : Trouvez chaque proposition vraie à propos de l'eau de Javel :

- A. C'est un produit de type détergent-désinfectant
- B. Elle a des propriétés chimiques oxydantes
- C. Ce n'est pas un produit sporicide
- D. Elle est virucide sur les virus des gastro-entérites

Q2 : Le temps nécessaire à un savonnage ou une friction des mains pour une efficacité correcte

- A. De 10 à 20 secondes
- B. De 20 à 30 secondes
- C. De 30 à 40 secondes
- D. De 40 à 50 secondes

Q3 : On parle de placenta accreta lors :

- A. D'une anomalie d'insertion du placenta
- B. D'une anomalie d'insertion du cordon ombilical
- C. les villosités trophoblastiques sont fixées sur le myomètre en l'absence de décidua,
- D. le cordon ombilical est inséré sur les membranes.

Q4 : Les signes cliniques suivants Troubles digestifs (hoquets, vomissements), métrorragies minimes, anomalies du RCF modérées et variables stagnation de la dilatation ; et un tableau progressif de choc sont évocateurs de :

- A. Placenta praevia sur utérus cicatriciel
- B. Hématome rétroplacentaire
- C. Rupture utérine sur utérus cicatriciel
- D. Hémorragie de benkiser.

Mme Dounia, âgée de 48 ans , obèse, G3 P3, enceinte d'une grossesse gémellaire à 34 SA, consulte à la maternité hospitalière pour maux de tête. L'examen trouve : TA =16/9 - Pouls = 99/mn , protéinurie au labstix à ++ et des oedèmes des membres inférieurs.. La hauteur utérine est à 40 cm. Les BDC fœtaux sont perçus chez les 2 jumeaux.

Q5 : Quel diagnostic probable peut-on soupçonner chez cette femme ?

- A. Rupture utérine
- B. Pré éclampsie
- C. Pathologie neurologique
- D. Toutes les propositions précédentes sont vraies.

Q6 : Quels sont, d'après les données, les facteurs de risque du diagnostic probable ?

- A. L'obésité
- B. La parité
- C. L'âge de la femme
- D. La gémellarité

Q7 : Quels examens doivent être demandés ?

- A. Bilan biologique
- B. Examen neurologique
- C. Examen du foie
- D. Diurèse

Q8 : Quelle sera la conduite à tenir ?

- A. Hospitalisation pour surveillance.
- B. Hospitalisation et extraction urgente des fœtus
- C. Réanimation maternelle rapide
- D. Toutes les propositions précédentes sont vraies

Q9 : Mme Z âgée de 36 ans enceinte, avec une aménorrhée de 5 semaines, G1P0 consulte pour douleurs de la fosse iliaque gauche depuis 3 jours. Température : 37.2°C ; TA = 9/6 ; Pouls : 110/mn avec pâleur conjonctivale. Sensibilité pelvienne diffuse.

Quel est le premier diagnostic à évoquer ?

- A. Avortement en cours
- B. Grossesse extra utérine
- C. Fausse couche
- D. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

Q10 : Quelle sera la prise en charge de cette parturiente.

- A. Hospitalisation
- B. Réanimation
- C. Traitement chirurgical
- D. Donner des antalgiques et envoyer la femme chez elle

Mme Ilham âgée de 30 ans , G3P3 , consulte à 32 SA , Sa grossesse actuelle est bien suivie : A l'examen : TA 12/6 - Poids : 60 kg - Taille : 1m60- HU : 26 cm - BCF sont à 142/mn.

Q11 : Vous concluez qu'il s'agit de :

- A. Retard de croissance en intra-utérine.
- B. Oligoamnios
- C. Malformation néonatale
- D. Erreur de datation

Q12 : La mesure de la hauteur utérine devra être à cet âge de la grossesse égal à :

- A. 34 cm
- B. 32 cm
- C. 30 cm
- D. 28cm

Q13 : Une parturiente hospitalisée en suite de couche, elle est au 6ème jour du post partum. Elle a accouché par voie basse. Elle présente une T : 38.5°C. Quels diagnostics vous évoquez ?

- A. pelvipéritonites des suites de couches ;
- B. Collections suppurées ;
- C. Thrombophlébites pelviennes suppurées
- D. Engorgement mammaire ou infection mammaire.

Q14 : Une asphyxie du nouveau-né est une :

- A. Baisse isolée de quantité d'oxygène dans le sang
- B. Baisse de quantité d'oxygène dans le sang associée à une acidose métabolique
- C. Baisse isolée de la quantité de sang dans les cellules
- D. Baisse de la quantité de sang dans les cellules associée à une acidose métabolique

Q15 : On note comme cause de la souffrance fœtale chronique :

- A. Infarctus placentaire
- B. Amnionite
- C. Insuffisance respiratoire
- D. Hypotension iatrogène.

Q16 : Le moyen le plus précoce pour diagnostiquer une grossesse est :

- A. L'examen clinique.
- B. La courbe thermique.
- C. Le dosage plasmatique des bêta HCG
- D. L'échographie endovaginale.

Q17 : La luteinizing hormone LH :

- A. Augmente au début du cycle menstruel
- B. Est synthétisée par les ovaires.
- C. Est responsable de l'ovulation.
- D. Est indispensable pour la nidation..

Q18 : Le risque d'avoir un cancer du sein:

- A. Augmente avec l'âge.
- B. Diminue avec l'âge.
- C. Augmente dans le cas de la puberté tardive
- D. Augmente dans le cas de la puberté précoce.

Q19 : Au cours du dégagement de la tête fœtale on parle de déflexion de la tête :

- A. Lorsque l'épaule est en sus-pubien.
- B. Lorsque l'épaule est sous la symphyse pubienne
- C. Lorsque l'occiput est sous la symphyse pubienne.
- D. Lorsque l'occiput est en sus pubien.

Q20: Au cours de l'accouchement, les variétés postérieures de la présentation :

- A. Nécessitent toujours une extraction instrumentale.
- B. Sont une contre indication à la ventouse obstétricale.
- C. Sont les plus fréquentes.
- D. Sont la cause d'un retard à l'expulsion.

Q21 : Lors d'une menace d'accouchement prématuré l'administration de corticoïdes chez la mère vise à prévenir :

- A. L'hémorragie cérébrale du nouveau-né.
- B. La maladie des membranes hyalines chez le nouveau né.
- C. Les complications neurologiques chez le nouveau né.
- D. Les complications gastriques chez le nouveau-né..

Q22 : Pendant la grossesse, est contre indiqué :

- A. Les vaccins à germes vivants atténués.
- B. La progestérone naturelle.
- C. Les cyclines.
- D. Les anticancéreux.

Q23 : On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :

- A. Un avortement ;
- B. Une diminution immunitaire.
- C. Un ictère néonatal.
- D. Une menace d'accouchement prématuré

Q24 : La vitamine D est une substance :

- A. Liposoluble
- B. Hydrosoluble
- C. Lipo et hydrosoluble
- D. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

Q25: La vitamine A est une substance liposoluble, c'est un micronutriment nécessaire pour le fonctionnement :

- A. Du système immunitaire
- B. Du système nerveux
- C. Du système respiratoire
- D. Du système digestif

Q26: L'allo-immunisation anti-rhésus est responsable de :

- A. Macrosomie
- B. Anémie fœtale
- C. Ictère néonatal grave
- D. Convulsions chez le nouveau né.

Q27 : Après l'accouchement, le corps utérin reprend son état prégrave en

- A. 04 mois
- B. 03mois
- C. 02 mois
- D. 01 mois

Q28 : Chez une femme enceinte les antécédents d'endométriose présente un risque potentiel de

- A. Avortement
- B. Accouchement prématuré.
- C. Retard de croissance en intra-utérin.
- D. Hématome rétro-placentaire.

Q29 : L'infection à haemophilus influenza type B :

- A. Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson.
- B. Engendre des séquelles neurosensorielles.
- C. Est responsable de pneumonie.
- D. Engendre une mortalité importante.

Q30 : Le vaccin contre le pneumocoque (VPC)

- A. Doit être conservé au réfrigérateur entre +2°C et +8°C
- B. Doit être administré en 3 prises.
- C. Doit être administré en 4 prises.
- D. Doit être administré en 5 prises

Q31 : La dysenterie se définit par :

- A. Une diarrhée qui débute brutalement et dure moins de 14 jours .
- B. Des épisodes diarrhéiques dont la durée est longue.
- C. L'émission de sang macroscopique dans les selles.
- D. Toutes les propositions précédentes sont fausses

Q32 : La carence en vitamine A chez l'enfant peut avoir comme conséquence :

- A. Des troubles de la vision.
- B. Une infection digestive.
- C. Une infection respiratoire.
- D. Une perte de poids.

Q33: Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de :

- A. Strabisme.
- B. Goitre.
- C. Rachitisme.
- D. Déficit mental.

Q34 : Les crevasses mammaires :

- A. Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon.
- B. Sont des ulcérations linéaires au niveau de l'aréole.
- C. Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l'accouchement.
- D. Surviennent les 2 ou 3 premiers mois après l'accouchement.

Q35 : Le tirage est :

- A. Un bruit particulier survenant à l'inspiration.
- B. Un bruit particulier survenant à l'expiration.
- C. Une dépression de la partie inférieure du thorax à l'inspiration.
- D. Une dépression de la partie inférieure du thorax à l'expiration.

Q36: Chez un enfant de 2 à 12 mois La respiration est dite rapide quand elle est :

- A. Entre 30 et 35 cycles par min.
- B. Entre 35 et 40 cycles par min.
- C. Entre 40 et 45 cycles par min.
- D. de 50 cycles ou plus par min.

Q37 : Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à :

- A. Un taux inférieur à 50%
- B. Un taux inférieur à 25%
- C. Un taux inférieur à 20%
- D. Un taux inférieur à 10%.

Q38 : La diphtérie est :

- A. une maladie Virale contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer.
- B. une maladie Virale contagieuse causée par le bacille de Koch.
- C. une maladie Bactérienne contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer.
- D. une maladie qui se développe dans l'arrière gorge et secrète une exotoxine.

Q39 : Selon le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, l'échographie du 1er trimestre doit être réalisée :

- A. Avant 11 semaines d'aménorrhée
- B. Avant 12 semaines d'aménorrhée
- C. Entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée.
- D. Entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée.

Q40 : La dépression du post-partum survient :

- A. Entre le 15ème jour et le 3^{ème} mois.
- B. Entre le 3ème jour et le 2^{ème} mois.
- C. Entre le 2ème jour et le 2^{ème} mois.
- D. Entre le 1er jour et le 1^{er} mois.

BON COURAGE